

# Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Σημειώσεις

<https://github.com/kongr45gpen/ece-notes>

2016

## Περιεχόμενα

<b>I</b>	<b>Ατρέας</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Μιγαδικοί Αριθμοί</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Μιγαδικές συναρτήσεις</b>	<b>5</b>
2.1	Όριο & Συνέχεια μιγαδικών συναρτήσεων μιγαδικής μεταβλητής . . . . .	9
2.2	Μιγαδική παράγωγος . . . . .	11
2.3	Ασκήσεις . . . . .	16
<b>3</b>	<b>Μιγαδική ολοκλήρωση</b>	<b>21</b>
3.1	Αντιπαράγωγος και ανεξαρτησία δρόμου . . . . .	23
3.2	Θεώρημα Cauchy . . . . .	24
3.3	Εφαρμογές . . . . .	27
<b>4</b>	<b>Ολοκληρωτικά υπόλοιπα και εφαρμογές</b>	<b>32</b>
4.0.1	Πώς βρίσκουμε (κάποιες φορές) την τάξη ενός πόλου $z_0$ . . . . .	35
4.0.2	Υπολογισμός ολοκληρωτικού υπολοίπου σε απομονωμένο ανώμαλο σημείο $z_0$	36
4.1	Εφαρμογές ολοκλ. υπολοίπων . . . . .	40
4.1.1	Λήμμα Jordan . . . . .	40
4.1.2	Υπολογισμός περίπλοκων ολοκληρωμάτων της μορφής $f(x)$ από $-\infty \rightarrow +\infty$	42
4.1.3	Ασκήσεις . . . . .	42
4.1.4	Υπολογισμός ολοκληρωμάτων της μορφής . . . . .	44
4.1.5	Υπολογισμός μετασχηματισμού Fourier τοπικά ολοκληρώσιμης συνάρτησης $f$	46
4.1.6	Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace . . . . .	47
<b>II</b>	<b>Κεχαγιάς</b>	<b>50</b>
<b>5</b>	<b>Μιγαδικοί αριθμοί</b>	<b>50</b>
5.1	Συναρτήσεις . . . . .	52
5.2	$n$ -οστές ρίζες . . . . .	53
<b>6</b>	<b>Βασικές μιγαδικές συναρτήσεις</b>	<b>55</b>
6.1	Εκθετική συνάρτηση . . . . .	55
6.2	Λογαριθμική Συνάρτηση . . . . .	58
6.3	Μιγαδικές δυνάμεις . . . . .	59
6.4	Μετασχηματισμοί & Απεικονίσεις . . . . .	61

6.4.1	Η γραμμική απεικόνιση . . . . .	61
6.4.2	Αντιστροφή $1/z$ . . . . .	63
6.4.3	Μετασχ. Möbius . . . . .	63
6.5	Τριγωνομετρικές και αντίστροφές τους . . . . .	64
<b>7</b>	<b>Ακολουθίες &amp; Σειρές</b>	
	<b>(Μιγαδικών αριθμών/συναρτήσεων)</b>	<b>65</b>
7.1	Δυναμοσειρές & Σειρές Laurent . . . . .	69
7.2	Δέκα Σειρές Laurent . . . . .	74
<b>8</b>	<b>Αρμονικές συναρτήσεις</b>	<b>79</b>
8.1	Τι σημαίνει/σε τι χρησιμεύει/τι είναι η εξίσωση του Laplace; . . . . .	80
8.2	Αρμονικές στην εξίσωση Laplace . . . . .	83
8.3	Επίλυση προβλήματος Dirichlet σε άλλα χωρία . . . . .	86
8.4	Τύποι του Poisson . . . . .	89
8.4.1	Τύπος του Poisson για ημιεπίπεδο . . . . .	89
8.4.2	Τύπος του Poisson για δίσκο . . . . .	90
8.4.3	Επίλυση της εξ. Laplace με χωρισμό μεταβλητών σε πολικές συντεταγμένες . . . . .	91

---

<http://users.auth.gr/natreas>

Σημειώσεις: Ατρέας Κεφ. 3-4-5

Κεχαγιάς Κεφ. 1-2-6

Βιβλία:

- Churchill - Brown (για μηχανικούς)
- Marsden (πιο μαθηματικό)

# Μέρος I

## Ατρέας

### Κεφάλαιο 1 Μιγαδικοί Αριθμοί

γεωμετρική παράσταση μιγαδικού

$$\text{Έστω } \mathbb{C} = \left\{ z = (x, y); x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

Είναι σύνολο εφοδιασμένο με τις πράξεις:

(α) Πρόσθεση μιγαδικών

Αν  $z_1 = (x_1, y_1)$  και  $z_2 = (x_2, y_2)$ , τότε:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

(β) Γινόμενο  $\lambda \in \mathbb{R}$  με μιγαδικό  $z$

Αν  $z = (x, y)$ , τότε ορίζω:

$$\lambda z = (\lambda x, \lambda y)$$

(γ) Πολλαπλασιασμό μιγαδικών αριθμών


Αν  $z_1 = (x_1, y_1)$ ,  $z_2 = (x_2, y_2)$ , τότε ορίζω:

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

Καλείται σύνολο των μιγαδικών αριθμών.

- Δεν μπορώ να συγκρίνω μιγαδικούς
- Οι γνωστές ιδιότητες των πράξεων ισχύουν στους μιγαδικούς

Η γεωμετρική παράσταση του  $\mathbb{C}$  είναι το λεγόμενο μιγαδικό επίπεδο.



$$x \in \mathbb{R} \xleftrightarrow{1-1} A = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$$

- $(x, 0), (y, 0) \in A \implies (x, 0) + (y, 0) = (x + y, 0) \in A$
- $(x, 0)(y, 0) = (xy, 0) \in A$

Στο εξής γράφω:

$$1 = (1, 0)$$

$$x = (x, 0)$$

**Ορίζω:**

$$i = (0, 1)$$

και καλείται φανταστική μονάδα του μιγαδικού επιπέδου.

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1$$

$$\boxed{i^2 = -1}$$

**Έτσι:**

$$z = (x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$$

$$\stackrel{x=(x,0)}{=} \stackrel{i=(0,1)}{=} x \cdot 1 + yi$$

$$\implies \boxed{z = x + iy}$$

$$\underbrace{z = x + iy}_{\text{άλγεβρα}} \iff \underbrace{z = (x, y)}_{\text{γεωμετρία}}$$

Έστω  $z = x + iy$

$$\stackrel{\text{πολικές}}{=} \stackrel{\text{του } (x,y)}{=} \rho \cos \theta + i \rho \sin \theta =$$

$$= \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

(1)

Έτσι, η (1) γράφεται ως:

$$z = |z| \underbrace{(\cos \theta + i \sin \theta)}$$

$$= |z| \cdot e^{i\theta}$$

όπου στο εξής:

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta}$$

τύπος του Euler

Τελικά:

$$\boxed{z = |z|e^{i\theta}} \text{ (πολική μορφή μιγαδικών)}$$

**Σημείωση:**  $\cos \theta + i \sin \theta$

$$\begin{aligned} & \stackrel{\text{σειρές}}{\text{McLaurin}} \left( 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \dots \right) + i \left( \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right) \\ & \stackrel{i^2 \equiv -1}{=} \left( 1 + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \dots \right) + \left( i\theta + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^5}{5!} + \dots \right) \\ & = 1 + (i\theta) + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \dots + \frac{(i\theta)^n}{n!} + \dots = e^{i\theta} \end{aligned}$$

- Ορίζω πρωτεύον όρισμα  $\text{Arg}z$  (μη μηδενικού) μιγαδικού  $z$  να είναι η γωνία  $\theta$  που σχηματίζει ο θετικός πραγματικός ημιάξονας του  $\mathbb{C}$  με την ημιευθεία  $OA$ , όπου  $A$  το σημείο της γεωμετρικής παράστασης του  $z = x + iy$ .


**Έτσι:**

$$z = |z|e^{i \text{Arg} z} \quad \text{πολική μορφή του } z$$

$$z_1 z_2 = |z_1|e^{i \text{Arg} z_1} |z_2|e^{i \text{Arg} z_2}$$

$$z_1 z_2 = |z_1||z_2|e^{i(\text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2)}$$

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{|z_1| e^{i\theta_1}}{|z_2| e^{i\theta_2}} \\ &= \left| \frac{z_1}{z_2} \right| e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \end{aligned}$$



**Ιδιότητα:**  $z\bar{z} = |z|^2$

## Κεφάλαιο 2 Μιγαδικές συναρτήσεις

Κάθε συνάρτηση  $f : A \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  καλείται μιγαδική συνάρτηση μιγαδικής μεταβλητής.

$$f = \underbrace{f(\underline{z})}_{\text{η μεταβλητή μιγαδικός}}$$

μιγαδική συνάρτηση διότι έχει τιμή μιγαδική

π.χ.

$$f(z) = z^2 \Rightarrow f(x + iy) = (x + iy)^2 = x^2 + (iy)^2 + 2x \cdot \underbrace{x^2 - y^2}_{\text{Re}(f)} + i \underbrace{(2xy)}_{\text{Im}(f)}$$

$$\text{γεωμετρική μορφή} \quad (x^2 - y^2, 2xy)$$

$$\text{Τελικά: } \boxed{f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)} \quad \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

π.χ.

$$f(z) = \frac{1}{|z|\bar{z}} \stackrel{z=x+iy}{=} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{z}{\bar{z}}$$

$$\stackrel{z\bar{z}=|z|^2}{=} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{z}{|z|^2} = \frac{x + iy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$\stackrel{\text{γεωμ}}{=} \frac{(x, y)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \stackrel{\vec{r}=(x,y)}{=} \boxed{\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3}}$$

Κεντρικό διαν. πεδίο που θυμίζει το πεδίο Coulomb.

$$\underbrace{f = f(z)}_{\text{μιγαδική μιν. μεταβλ.}} \xleftrightarrow{1-1} \begin{matrix} \text{διανυσμ. πεδίο του } \mathbb{R}^2 \\ F(x, y) = (u(x, y), v(x, y)) \end{matrix}$$


όπου  $u, v$  πραγμ. συναρτ. 2 μεταβλητών

**Υπάρχουν**  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ , μιγαδικές συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής  
π.χ

$$f(t) = e^{it}, t \in (0, \pi]$$

$$= \cos t + i \sin t$$

$$t \rightarrow (\cos t, \sin t) \quad \text{καμπύλη } x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$



Η γραφ. παράσταση της  $f(t) = e^{it}, t \in (-\pi, \pi)$  είναι ο μοναδιαίος κύκλος κέντρου  $(0, 0)$  με αντιωρολογιακή φορά.

$$g(t) = 1 + it, t \in \mathbb{R}, = (1, t) = (1, 0) + t(0, 1)$$

Το πεδίο ορισμού μιγαδικών συναρτήσεων μιγαδ. μεταβλητών υπολογίζεται ως συνήθως (με τις πραγματικές συναρτήσεις) ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ Διαφοροποιήσεις

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

Πρέπει ο παρον. να είναι διάφορος του μηδενός: Έτσι  $z \neq 0$  Άρα Π.Ο =  $\mathbb{C} - \{(0, 0)\}$

$$g(z) = \frac{z}{z^2 + 2}$$

**Σημείωση** Η  $g$  είναι ρητή συνάρτηση (δηλ. ηλίκο δύο (μιγαδικών) πολυωνύμων). Κάθε συνάρτηση της μορφής  $a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$ ,  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$  καλείται (μιγαδικό) πολυώνυμο. Πρέπει παρον.  $\neq 0$  δηλ:

$$z^2 + 2 = 0 \left( \begin{array}{l} \text{ΠΡΟΣΟΧΗ!! Κάθε μιγαδικό} \\ \text{πολυώνυμο βαθμού } N \text{ έχει} \\ \text{ΑΚΡΙΒΩΣ } N \text{ ρίζες στο } \mathbb{C} \end{array} \right)$$

$$z^2 + 2 = 0 \xrightarrow{i^2 = -1} z^2 - 2i^2 = 0$$

$$\Rightarrow (z - \sqrt{2}i)(z + \sqrt{2}i) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{z = \pm \sqrt{2}i}$$

**Τελικά** Π.Ο =  $\mathbb{C} - \{\pm \sqrt{2}i\}$

$$\boxed{h(z) = \text{Arg } z, \text{ Π.Ο} = \mathbb{C} - \{0\}}$$

Για  $z = 0$  ΔΕΝ ορίζεται όρισμα, επειδή  $0 = |0| \cdot e^{i\theta} \forall \theta$

**Σημείωση**  $az^2 + bz + c = 0$

$a, b, c \in \mathbb{C}$

Λύνεται με διακρίνουσα κατά τα γνωστά.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σχήμα Horner για πολυώνυμο (με πραγματικούς συντελεστές) βαθμού  $N \geq 3$ .

$$\begin{aligned} a(z) &= e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} \\ &= e^x(\cos y + i \sin y) \\ &= (e^x \cos y, e^x \sin y), \quad x, y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$


Ως διανυσματικό πεδίο προφανώς Π.Ο =  $\mathbb{R}^2$

Έτσι Π.Ο =  $\mathbb{C}$ .

$l(z) = \text{Log}$  (αντίστροφη της  $e^z$ )

$\text{Log} \stackrel{\text{ορισμός}}{:=} \ln |z| + i \text{Arg } z$   
 μιγαδικός λογάριθμος

$$\text{Π.Ο} = \mathbb{C} - \{0\}$$



$$\begin{aligned} \text{Log}(-3) &= \ln |-3| + i \text{Arg}(-3) \\ &= \ln 3 + i\pi \end{aligned}$$

$$\lambda(z) = \sin z \stackrel{\text{ορισμός}}{:=} \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\left( \begin{array}{l} e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad \theta \in (-\pi, \pi] \\ e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta \\ \hline \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{array} \right)$$

$$\text{Π.Ο} = \mathbb{C}$$

$$m(z) = \cos z \stackrel{\text{ορισμός}}{:=} \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\text{Π.Ο} = \mathbb{C}$$

Όλες οι γνωστές τριγωνομετρικές ταυτότητες ισχύουν στο  $\mathbb{C}$  όπως στο  $\mathbb{R}$ .

$$h(z) = \sqrt[n]{z} := \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{2k\pi + \text{Arg } z}{n}} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

(Η  $\sqrt[n]{a}$  ορίζεται ως το **σύνολο** όλων των λύσεων της εξίσωσης  $z^n = a$ ,  $a \in \mathbb{C}$ )

$$\text{Π.Ο} = \mathbb{C} - \{0\}$$



## 2.1 Όριο/Συνέχεια μιγαδικών συναρτήσεων μιγαδικής μεταβλητής

### Ορισμός

Έστω  $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$  μιγ. συνάρτηση ορισμένη σε σύνολο  $A \subset \mathbb{C}$ ,  $z_0 = x_0 + iy_0$  είναι σ.συσσ. του  $A$  και έστω  $a = a_0 + ib_0$ . Τότε

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a \in \mathbb{C}$$

$$\Downarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = a_0 \\ \text{ΚΑΙ} \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = b_0 \end{array} \right.$$

**Επίσης**, αν  $z_0 \in A$ , τότε  
 $f$  συνεχής στο σημείο  $z_0$

$\Downarrow$

οι συναρτήσεις  $u, v : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  είναι ΣΥΝΕΧΕΙΣ στο σημείο  $(x_0, y_0)$  (ως πραγματικές συναρτήσεις δύο μεταβλητών)

**Έτσι:**

$$\left. \begin{array}{l} \text{οι πολωνυμικές} \\ \text{η εκθετική} \\ \text{οι τριγωνομετρικές } (\sin z, \cos z) \\ \text{οι υπερβολικές } (\operatorname{ch}, \operatorname{sh}) \end{array} \right\} \text{συνεχείς στο } \mathbb{C}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{οι ρητές} \\ \text{οι τριγωνομετρικές } (\tan z, \cot z) \end{array} \right\} \text{συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους}$$

Ορίζω το  $\infty$  του μιγαδικού επιπέδου να είναι το σύνολο σημείων που απέχουν "άπειρη" απόσταση από την αρχή των αξόνων.

Το επεκτεταμένο μιγαδικό επίπεδο ορίζεται ως:

$$\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}, \text{ όπου:}$$

$$\infty + z = \infty \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\infty \cdot z = \infty \quad \forall z \neq 0$$

$$\frac{z}{\infty} = 0 \quad \forall z \neq \infty$$

Όλες οι πράξεις του ορίου που ξέρετε ισχύουν και στους μιγαδικούς (αρκεί να μην εμφανίζονται οι γνωστές απροσδιόριστες μορφές):

$$0 \cdot \infty, \frac{\infty}{\infty}, 0^0, 1^\infty, \infty^0$$

Ο κανόνας De l' Hospital ισχύει στους μιγαδικούς.

**Σημείωση:**

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = a \in \mathbb{C} \iff \lim_{z \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = a \in \mathbb{C}$$


$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \iff \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = 0 \iff \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = 0$$

**Θεώρημα**


Έστω  $\text{Arg } z : \mathbb{C} - \{0\} \rightarrow (-\pi, \pi]$   
 Τότε η  $\text{Arg } z$  **είναι συνεχής** στο σύνολο:

$$\mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{x + iy : x \leq 0 \text{ ΚΑΙ } y = 0\}$$




Έστω  $z = x + iy$


(α)  $x > 0, y > 0$




(β)  $x < 0, y > 0$



(γ)  $x < 0, y < 0$



(δ)  $x > 0, y < 0$



$$\text{Arg } z = \begin{cases} \arctan \left| \frac{y}{x} \right|, & x, y > 0 \\ \pi - \arctan \left| \frac{y}{x} \right|, & x < 0, y > 0 \\ -\pi + \arctan \left| \frac{y}{x} \right|, & x < 0, y < 0 \\ -\arctan \left| \frac{y}{x} \right|, & x > 0, y < 0 \end{cases}$$

Για  $x = 0$ , τότε  $\text{Arg} := \frac{\pi}{2}$  ή  $-\frac{\pi}{2}$   
 Για  $y = 0$ , τότε  $\text{Arg} := 0$  ή  $\pi$

### Σημεία ασυνέχειας του $\text{Arg } z$

Έστω  $z_0 = x_0 < 0$

• Έστω  $z = x_0 + it$  ( $t > 0$ )

Για  $t \rightarrow 0^+$ ,  $z \rightarrow z_0 = x_0$ , αλλά:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \text{Arg } z \stackrel{z=x_0+it}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \text{Arg}(x_0 + it) \stackrel{\text{2ο τετ.}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \pi - \arctan \left| \frac{t}{x_0} \right| \right) = \pi - \arctan 0 = \pi$$

• Για  $z = x_0 + it$  ( $t < 0$ ), τότε:

$t \rightarrow 0^-$ ,  $z \rightarrow z_0$ , και

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \text{Arg } z = \lim_{t \rightarrow 0^-} \text{Arg}(x_0 + it) \stackrel{\text{3ο τετ.}}{=} -\pi + \arctan 0 = -\pi$$

Άρα το όριο στο  $z_0 = x_0$  ΔΕΝ υπάρχει, και έτσι η  $\text{Arg } z$  ασυνεχής στα  $z = x_0$  με  $x_0 \leq 0$ .

Αν  $\text{Arg } z \in [0, 2\pi)$  πού είναι ασυνεχής;

## 2.2 Μιγαδική παράγωγος

### Ορισμός

Έστω  $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $A$  ανοικτό,  $z_0 \in A$ . Λέμε ότι η  $f$  είναι μιγαδικά παραγωγίσιμη στο σημείο  $z_0$ , αν υπάρχει το ΟΡΙΟ:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = a \in \mathbb{C}$$

(ή ισοδύναμα  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h} = a \in \mathbb{C}$ )

Στο εξής το όριο αυτό συμβολίζουμε με  $f'(z_0)$  ή  $\frac{df(z_0)}{dz}$

## Ορισμός

Αν  $f : A \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $A$  ανοικτό,  $z_0 \in A$ , θα λέμε στο εξής ότι η  $f$  είναι ΟΛΟΜΟΡΦΗ (ή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ - holomorphic/analytic) **στο σημείο**  $z_0$ , εάν η  $f$  είναι μιγαδικά παραγωγίσιμη **ΣΕ ΚΑΘΕ**

**ΣΗΜΕΙΟ** του ανοικτού δίσκου



$$D_\epsilon(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \epsilon\}$$

για κάποιο  $\epsilon > 0$

Αν  $f$  ολόμορφη σε ΚΑΘΕ σημείο του  $A$  λέμε ότι η  $f$  ολόμορφη στο  $A$ .

## Ορισμός

Αν  $A$  μη ανοικτό, λέμε ότι η  $f$  ολόμορφη στο  $A$ , αν υπάρχει  $B \supset A$ ,  $B$  ανοικτό ώστε η  $f$  να είναι ολόμορφη στο  $B$ .

Όλες οι γνωστές ιδιότητες της παραγώγου που γνωρίζετε ισχύουν και για τη μιγαδική παράγωγο.

**π.χ.** Έστω  $f, g$  **μιγαδικά** παραγωγίσιμες σε σημείο  $z_0$ . Τότε:

- $f$  παραγ. στο  $z_0 \Rightarrow f$  συνεχής στο  $z_0$
- $(af \pm by)'(z_0) = af'(z_0) + bg'(z_0) \quad \forall a, b \in \mathbb{C}$
- $(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g^2(z_0)} \quad (g(z_0) \neq 0)$
- Ο κανόνας αλυσίδας ισχύει στις μιγαδικές συναρτήσεις:

$$(h \circ g)'(z_0) = h'(g(z_0))g'(z_0)$$

υπό την προϋπόθεση ότι η σύνθεση καλά ορισμένη

**Παραγωγή αντίστροφης συνάρτησης** Έστω  $f$  ολόμορφη σε σημείο  $z_0$  με  $f'(z_0) \neq 0$ .

Αν  $w_0 = f(z_0)$ , τότε υπάρχουν  $\epsilon, \epsilon' > 0$  ώστε η αντίστροφη συνάρτηση  $f^{-1} : D_\epsilon(w_0) \rightarrow D_{\epsilon'}(z_0)$  καλά ορισμένη, ολόμορφη στο  $w_0$  και

$$(f^{-1})'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$$

### Θεώρημα: Εξισώσεις Cauchy-Riemann

Έστω  $f : A \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} : f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ .

Θεωρώ  $z = x + iy$ ,  $z_0 = x_0 + iy_0$  και  $A$  ανοικτό.

Τότε:

$f$  μιγαδικά παραγωγίσιμη στο  $z_0$

↕

(α) Η  $F(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$  είναι **διαφορίσιμο** διανυσμ. πεδίο στο σημείο  $(x_0, y_0)$

ΚΑΙ

(β)

$$\begin{cases} u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \\ u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0) \end{cases} \quad \leftarrow \text{εξισώσεις C-R}$$

**Πόρισμα (ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΑΤΟ)** Αν  $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$  είναι έτσι ώστε:

(α)  $u, v$  έχουν συνεχείς μερικές παραγώγους στο  $(x_0, y_0)$  και "κοντά" στο  $(x_0, y_0)$

$$(β) \begin{cases} u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \\ u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0) \end{cases} \quad \leftarrow \text{C-R}$$

Τότε ( $\Rightarrow$ ) η  $f$  είναι μιγαδικά παραγωγίσιμη στο  $z_0 = x_0 + iy_0$

**Παρ.**


$$\begin{aligned} z^2 &= (x + iy)^2 = x^2 + 2ixy - y^2 = \\ &= x^2 - y^2 + i(2xy), \text{ άρα} \end{aligned}$$

$$f = (x^2 - y^2, 2xy) \quad \left| \begin{array}{l} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{array} \right.$$

**Παρατηρήσεις**

(α) Έστω  $f$  μιγαδικά παραγ. συνάρτηση σε σημείο  $z_0 = x_0 + iy_0$ . Τότε εξ' ορισμού υπάρχει το όριο

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$



- Έστω  $z = x + iy_0$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) είναι τυχαίο σημείο της "οριζόντιας" ευθείας που διέρχεται από το  $z_0$
- Για  $x \rightarrow x_0$ , τότε  $z = x + iy_0 \rightarrow x_0 + iy_0 = z_0$  (δηλ.  $z \rightarrow z_0$  όταν  $x \rightarrow x_0$  πάνω στην οριζόντια ευθεία)

Τότε για  $z = x + iy_0$  έχω:


$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x, y_0) + iv(x, y_0) - (u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0))}{x + iy_0 - (x_0 + iy_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x, y_0) - u(x_0, y_0)}{x - x_0} + i \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{v(x, y_0) - v(x_0, y_0)}{x - x_0} \\ &= u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) \\ &\Rightarrow \boxed{f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)} := \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \end{aligned}$$

Με όμοιο τρόπο, αν εργαστούμε κατά μήκος της "κάθετης" ευθείας που διέρχεται από το  $z_0$ , έχουμε:

$$\boxed{f'(z_0) = v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0)} := -i \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}$$

(β) Γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \frac{df(z_0)}{dz} \\ \Rightarrow \boxed{df(z_0) = f'(z_0) dz} \end{aligned}$$



$dz :=$  στοιχειώδης όγκος  
στο επίπεδο  $xy$

$df(z_0) :=$  στοιχειώδες χωρίο στο επίπεδο  $uv$   
στο οποίο μετασχηματίζεται το  $dz$   
μέσω της απεικόνισης  $f$

$$df(z_0) = |f'(z_0)| e^{i \operatorname{Arg} f'(z_0)} dz \quad (f'(z_0) \neq 0)$$

Για τις παραγώγους στοιχειωδών συναρτήσεων ισχύουν τα συνήθη από την πραγματική ανάλυση.

**π.χ** Αν  $f(z) = e^z$ , τότε  $(e^z)' = e^z \forall z \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} f(z) = e^z &= e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \\ &= \underbrace{e^x \cos y}_{u(x,y)} + i \underbrace{(e^x \sin y)}_{v(x,y)} \end{aligned}$$

Ορίζω  $\begin{cases} u(x, y) = \operatorname{Re}(e^z) = e^x \cos y \\ v(x, y) = \operatorname{Im}(e^z) = e^x \sin y \end{cases}$

•  $u, v$  καλά ορισμένες  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , και επιπλέον  $u, v$  είναι **ΣΥΝΕΧΕΙΣ**  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

•  $\begin{matrix} u_x = e^x \cos y & u_y = -e^x \sin y \\ v_x = e^x \sin y & v_y = e^x \cos y \end{matrix}$ , έτσι παρατηρώ ότι  $\begin{cases} u_x = v_y \\ \text{ΚΑΙ } u_y = -v_x \end{cases} \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

$\xrightarrow{\text{πόρισμα}}$   $f(z) = e^z$  μιγαδικά παραγωγίσιμη  $\forall z \in \mathbb{C}$

• Γνωρίζω ότι αν η  $f = u + iv$  είναι μιγ. παραγ., τότε  $f'(z) = u_x + iv_x$ .

**Έτσι** στην προκειμένη περίπτωση:

$$f'(z) = (e^z)' = u_x + iv_x = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^x (\cos y + i \sin y) = e^x e^{iy} = e^z$$

**π.χ**  $(\operatorname{Log} z)' = \frac{1}{z} \forall z \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{x + iy : x \leq 0 \text{ και } y = 0\}$  (υπό την προϋπόθεση ότι  $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$ )

διότι  $\operatorname{Log} z = w \xLeftrightarrow{\text{ορ.}} z = e^w$ , άρα  $\forall z \in \mathbb{C}^*$ , από το θεώρ. παραγώγισης αντίστροφης συνάρτησης έχουμε:  $(\operatorname{Log} z)' = \frac{1}{e^w} = \frac{1}{z}$

Με την ίδια λογική (και με χρήση των ιδιοτήτων παραγώγου) αποδεικνύεται ότι:

- $(z^n)' = nz^{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $(z^{-n})' = -nz^{-n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall z \in \mathbb{C} - \{0\}$
- $(z^a)' = az^{a-1} \quad \forall a \in \mathbb{Q}$  ή  $a$  άρρητος ή  $a$  έχει μη μηδενικό φανταστικό μέρος  
 $\forall z \in \mathbb{C}^* (\mathbb{C}^* \text{ όπως στο λογάριθμο πριν})$
- $(\sin z)' = \cos z \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $(\cos z)' = -\sin z \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $(\sinh z)' = \cosh z \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $(\cosh z)' = \sinh z \quad \forall z \in \mathbb{C}$
- $(a^z)' = a^z \operatorname{Log} a \quad \forall z \in \mathbb{C}$

κλπ.

## 2.3 Ασκήσεις


ΝΔΟ η  $f(z) = \bar{z}$  ΔΕΝ είναι μιγαδικά παραγωγίσιμη **σε κανένα** σημείο του  $\mathbb{C}$ .

- $\bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy$ , ορίζω  $\left| \begin{array}{l} u(x, y) = x \\ v(x, y) = -y \end{array} \right.$


- Προφανώς  $u$  και  $v$  καλά ορισμένες και συνεχείς  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , αλλά:

$$u_x = 1 \neq -1 = v_y$$

$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , άρα αφού η μία από τις δύο εξισ. C-R δεν ισχύει  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , η  $f(z) = \bar{z}$  ΔΕΝ είναι μιγαδικά παραγ.  $\forall z \in \mathbb{C}$ .




$$df(z) = f'(z) dz = \underbrace{|f'(z)|}_{\text{μεγέθυνση}} \underbrace{e^{i \text{Arg} f'(z)}}_{\text{περιστροφή}} dz$$



$$f(z) = e^z = e^x \cos y + i e^x \sin y$$

$$\left| \begin{array}{l} u = e^x \cos y_0 \\ v = e^x \sin y_0 \end{array} \right.$$





**Άσκ. 2** Η συνάρτηση  $f(z) = |z|$  **ΔΕΝ** είναι μιγαδικά παραγωγίσιμη σε **ΚΑΝΕΝΑ** σημείο του  $\mathbb{C}$ .

Οι εξισώσεις C-R σε πολικές συντ/νες είναι οι εξής:

$$\begin{cases} u_\rho = \frac{1}{\rho}v_\theta & \forall \rho > 0, \theta \in (-\pi, \pi] \\ u_\theta = -\rho v_\rho \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(z) &= f(x + iy) \\ &= f(|z|e^{i \operatorname{Arg} z}) = f(\rho e^{i\theta}) = u(\rho, \theta) + iv(\rho, \theta) \end{aligned}$$

$$f(z) = |z| = \rho, \text{ άρα } \begin{cases} u(\rho, \theta) = \rho \\ v(\rho, \theta) = 0 \end{cases}$$

Οι  $u, v$  καλά ορισμένες και συνεχείς  $\forall \rho > 0, \theta \in (-\pi, \pi]$  αλλά

$$u_\rho = 1 \neq \frac{1}{\rho} \cdot 0 = \frac{1}{\rho}v_\theta \quad \forall \rho > 0, \theta \in (-\pi, \pi]$$

και αφού μία από τις εξισώσεις C-R δεν ισχύει  $\forall \rho > 0, \theta \in (-\pi, \pi]$  αναγκαστικά η  $f(z) = |z|$  δεν είναι μιγαδικά παραγ. σε κανένα σημείο του  $\mathbb{C}$ .

**π.χ**

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad z \neq 0 \\ |z|^2 &= z\bar{z} \quad \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{1}{z} \end{aligned}$$

άρα η  $f$  είναι παραγωγίσιμη.

**Άσκ. 3** Υπολογίστε τα όρια:

(α)  $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{z^2} - 1}{z^2}$

(β)  $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^2 - 1}{\bar{z}^2 - 1}$

(γ)  $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$


Στα όρια ισχύει ο De L' Hospital

(α)

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{z^2} - 1}{z^2} \stackrel{\left(\frac{0}{0}\right)}{\underset{\text{L'Hospital}}{=}} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2ze^{z^2} - 0}{2z} = \lim_{z \rightarrow 0} e^{z^2} = e^0 = 1$$

διότι  $e^{z^2} - 1$  και  $z^2$  μιν. παραγ.

(β) Θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι το όριο δεν υπάρχει, κάτι που φαντάζομαι επειδή μέσα στο όριο υπάρχει ο  $\bar{z}$ .



- Θεωρώ την "κίνηση κατά μήκος του οριζόντιου άξονα" που διέρχεται από το  $z_0 = 1$ .  
**Δηλ.** θεωρώ σημεία  $z$  της μορφής

$$z = x + i0 \quad (x \in \mathbb{R})$$

Προφανώς για  $x \rightarrow 1$ , έχω:  $z \rightarrow z_0 = 1$ .  
Τότε  $\forall z = x$  έχω:

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^2 - 1}{\bar{z}^2 - 1} \underset{\text{του οριζ. άξονα}}{\overset{\text{κατα μήκος}}{=}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 1} = 1$$

- Θεωρώ την "κίνηση κατά μήκος του κάθετου άξονα" που διέρχεται από το  $z_0 = 1$ , δηλαδή σημεία:

$$z = 1 + iy \quad (y \in \mathbb{R})$$

Προφανώς για  $y \rightarrow 0$ , έχω  $z \rightarrow z_0 = 1$ , και

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^2 - 1}{\bar{z}^2 - 1} &\underset{\text{του κατακόρυφου άξονα}}{\overset{\text{κατα μήκος}}{=}} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(1 + iy)^2 - 1}{(1 - iy)^2 - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cancel{1} + 2iy - y^2 - \cancel{1}}{\cancel{1} - 2iy - y^2 - \cancel{1}} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2iy - y^2}{-2iy - y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2i - y}{-2i - y} = \frac{2i}{-2i} = -1 \end{aligned}$$

Εφόσον  $1 \neq -1$  το όριο ΔΕΝ υπάρχει.

(γ)  $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = ?$

- Έστω  $z = x$  ( $x < 0$ ), για  $x \rightarrow -\infty$ , τότε  $z \rightarrow \infty$  και  $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- Έστω  $z = x$  ( $x > 0$ ), για  $x \rightarrow +\infty$ , τότε  $z \rightarrow \infty$ , αλλά:  $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ , συνεπώς το  $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$  ΔΕΝ υπάρχει.

**Άσκ. 4** Αν  $f(z) = u + iv$  είναι ακεραία (ολόμορφη στο  $\mathbb{C}$ ) και αν

$$au + bv = c$$

όπου  $a, b, c \in \mathbb{R}$  σταθερές όχι όλες ίσες με μηδέν, ΝΔΟ  $f(z) = A$ ,  $A \in \mathbb{C}$  σταθερά.

- Έστω  $c = 0$ , εξ' υποθέσεως  $a^2 + b^2 \neq 0$
- Έστω  $c \neq 0$ , πάλι πρέπει  $a^2 + b^2 \neq 0$  (διότι αλλιώς  $0 = c$ , άτοπο)
- Τελικά  $a^2 + b^2 \neq 0$  σε κάθε περίπτωση.

$$\begin{aligned} \begin{cases} au_x + bv_x = 0 \\ au_y + bv_y = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{bmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[u_y = -v_x \text{ αφού } f \text{ ακεραία}]{u_x = v_y} \begin{bmatrix} u_x & -u_y \\ u_y & u_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} u_x & -u_y \\ u_y & u_x \end{vmatrix} = u_x^2 + u_y^2$$

και επειδή  $a^2 + b^2 \neq 0$ , πρέπει  $u_x^2 + u_y^2 = 0$  για να έχει λύση το σύστημα  $\Rightarrow u_x = 0$  και  $u_y = 0 \xrightarrow{\text{C-R}} u_x = u_y = v_x = v_y = 0 \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow f(z) = A \in \mathbb{C}$  σταθερά.

**Άσκ.** Βρείτε τα σημεία ολομορφίας των συναρτήσεων:


(α)  $f(z) = \text{Log}(z - i)$

(β)  $g(z) = \tan z$

(α) Έστω ότι  $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$ . Τότε είναι γνωστό ότι η  $\text{Log } z$  είναι μιγαδικά παραγ. στο  $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{x + iy \mid x \leq 0 \text{ και } y = 0\}$ .


Έτσι η  $\text{Log}(z - i)$  είναι μιγ. παραγ. στο σύνολο

$$\begin{aligned} &\mathbb{C} - \{x + iy \mid \text{Re}(z - i) \leq 0 \text{ και } \text{Im}(z - i) = 0\} \\ &\stackrel{z=x+iy}{=} \mathbb{C} - \{x + iy \mid x \leq 0 \text{ και } y - 1 = 0\} \\ &= \mathbb{C} - \{x + iy \mid x \leq 0 \text{ και } y = 1\} \end{aligned}$$



(β)  $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ , η  $g$  είναι ολόμορφη στο  $\mathbb{C}$  εκτός των σημείων που μηδενίζουν τον παρονομαστή.

$$\begin{aligned} \bullet \cos z = 0 &\iff \cos(x + iy) = 0 \iff \cos x \cos(iy) - \sin x \sin(iy) = 0 \xleftrightarrow{\text{op. sin \& cos}} \\ &\iff \cos x \cdot \frac{e^{-y} + e^y}{2} - \sin x \cdot \frac{e^{-y} - e^y}{2i} = 0 \iff \cos x \cdot \cosh y - i \sin x \cdot \sinh y = 0 \iff \\ &\left| \begin{array}{l} \cos x \cdot \cosh y = 0 \\ \text{και} \\ \sin x \cdot \sinh y = 0 \end{array} \right. \iff \left| \begin{array}{l} \cos x = 0 \\ \text{και} \\ \sin x = 0 \\ \text{(Αδύνατο)} \end{array} \right. \quad \text{ή} \quad \left| \begin{array}{l} \cos x = 0 \\ \text{και} \\ \sinh y = 0 \end{array} \right. \iff \left| \begin{array}{l} x = k\pi + \frac{\pi}{2} \\ y = 0 \end{array} \right., k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$



**Τελικά**  $\cos z \iff z = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$  και έτσι  $g$  είναι ολόμορφη στο

$$\mathbb{C} - \left\{ k\pi + \frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**Άσκ.** Έστω  $f(x + iy) = (x^2 + 2y) + i(x^2 + y^2)$

(i) Να γραφεί η  $f$  συναρτήσει του  $z = x + iy$

(ii) Να βρείτε όλα τα σημεία, όπου η  $f$  είναι μιγαδικά παραγωγίσιμη

(iii) Να βρείτε όλα τα σημεία στα οποία η  $f$  είναι ολόμορφη

(i)  $x = \frac{z + \bar{z}}{2}, y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$   
 $(z = x + iy)$

$$\begin{aligned} f(z) &= \left( \frac{z + \bar{z}}{2} \right)^2 + 2 \left( \frac{z - \bar{z}}{2i} \right) + i \left( \left( \frac{z + \bar{z}}{2} \right)^2 + \left( \frac{z - \bar{z}}{2i} \right)^2 \right) \\ &= \frac{z^2 + 2z\bar{z} + \bar{z}^2}{4} - i(z - \bar{z}) + i \left( \frac{z^2 + 2z\bar{z} + \bar{z}^2}{4} - \frac{z^2 - 2z\bar{z} + \bar{z}^2}{4} \right) \\ &= \frac{z^2 + 2|z|^2 + \bar{z}^2}{4} - i(z - \bar{z} - |z|^2) \end{aligned}$$

(ii) Προφανώς  $\left| \begin{array}{l} \operatorname{Re}(f) := u(x, y) = x^2 + 2y \\ \operatorname{Im}(f) := v(x, y) = x^2 + y^2 \end{array} \right.$

• Οι  $u$  και  $v$  είναι συνεχείς (ως πολυωνυμικές)  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$\bullet \left\{ \begin{array}{l} u_x = v_y \\ \text{ΚΑΙ} \\ u_y = -v_x \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} 2x = 2y \\ \text{ΚΑΙ} \\ 2 = -2x \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} x = y \\ \text{ΚΑΙ} \\ x = -1 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} x = -1 \\ \text{ΚΑΙ} \\ y = -1 \end{array} \right.$$

Άρα η  $f$  είναι μιγαδ. παραγ. **μόνον** στο  $\boxed{z = -1 - i}$ , και μάλιστα, εφ' όσον  $f'(z) = f'(x + iy) = u_x + iv_x$ :

$$f'(-1 - i) = 2(-1) + i2(-1) = \underline{\underline{-2 - i2}}$$

(iii) ΔΕΝ υπάρχουν σημεία όπου η  $f$  είναι ολόμορφη.

# Κεφάλαιο 3 Μιγαδική ολοκλήρωση

## Εισαγωγή

### Ορισμός

Καλούμε **καμπύλη** στο μιγαδικό επίπεδο κάθε συνεχή συνάρτηση

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} : \gamma(t) = x(t) + iy(t)$$

όπου  $x, y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  συνεχείς πραγματικές συναρτήσεις.

**Έτσι:**  $\gamma(t)$  καλείται

**ΑΠΛΗ** αν είναι 1-1 (δεν αυτοτέμνεται)

**ΚΛΕΙΣΤΗ** αν έχει ίδια αρχή και πέρας


**ΛΕΙΑ** αν είναι παραγωγίσιμη στο  $[a, b]$  με συνεχή παράγωγο

$$\gamma'(t) = x'(t) + iy'(t)$$

και μη μηδενική παράγωγο  $\forall t$


- Κάθε τέτοια καμπύλη έχει ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (φορά διαγραφής) προς την κατεύθυνση αύξησης του  $t$

**π.χ.**  $\gamma(t) = e^{it}, t \in (-\pi, \pi]$




μοναδιαίος κύκλος  
κέντρου  $(0, 0)$

$\gamma(t) = e^{-it}, t \in (-\pi, \pi]$



- Αν  $\gamma$  κλειστή λέω ότι είναι θετικά προσανατολισμένη αν η φορά διαγραφής είναι η αντιωρολογιακή
- $-\gamma$ : ίδιο ίχνος με τη  $\gamma$ , αλλά αντίθετη φορά διαγραφής



## Ορισμός

Έστω  $f = f(z)$  ΣΥΝΕΧΗΣ μιγαδική συνάρτηση μιγαδικής μεταβλητής και  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  λεία καμπύλη. Καλώ επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της  $f$  ΠΑΝΩ στη  $\gamma$  να είναι ο ΜΙΓΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \underbrace{\gamma'(t) dt}_{d\gamma(t)}$$

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

$$\begin{aligned} d\gamma(t) &= d(x(t) + iy(t)) = \\ &= dx(t) + i dy(t) = (x'(t) + iy'(t)) dt \end{aligned}$$

$$d\gamma(t) = \gamma'(t) dt$$

Οι κλασικές ιδιότητες των επικαμπυλίων ολοκληρωμάτων έργου ισχύουν στους μιγαδικούς. Ενδεικτικά:

- $\int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz$
- $\int_{\gamma} (af + bg)(z) dz = a \int_{\gamma} f(z) dz + b \int_{\gamma} g(z) dz \quad \forall a, b \in \mathbb{C}$
- $\int_{\gamma_1 + \gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$
- $\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| dz \leq M \cdot (\text{μήκος της } \gamma) \text{ όπου } M \text{ μέγιστο της } |f| \text{ επί της } \gamma$
- $\int_{\gamma} |dz| = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt := \text{μήκος της καμπ. } \gamma$

**Πρόταση:** Έστω  $f(z) = f(x+iy) = u(x, y) + iv(x, y)$  συνεχής επί καμπύλης λείας  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ .  
**Τότε:**

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \underbrace{\left( \int_{\gamma} u dx - v dy \right)}_{\substack{\text{επικαμπύλιο ολοκλ.} \\ \text{διαν. πεδίου στον } \mathbb{R}^2}} + i \underbrace{\left( \int_{\gamma} u dy + v dx \right)}_{\substack{\text{επικαμπύλιο ολοκλ.} \\ \text{διαν. πεδίου στον } \mathbb{R}^2}}$$

**Απόδ.**

$$\begin{aligned} & \int_{\gamma} (u + iv) d(x + iy) \\ &= \int_a^b [u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))] (x'(t) + iy'(t)) dt \\ &= \int_a^b (u(x(t), y(t)) x'(t) - v(x(t), y(t)) y'(t)) dt + i \int_a^b (u(x(t), y(t)) y'(t) + v(x(t), y(t)) x'(t)) dt \\ &\stackrel{\text{οπ.}}{=} \left( \int_{\gamma} u dx - v dy \right) + i \left( \int_{\gamma} u dy + v dx \right) \end{aligned}$$

Ορίζω  $\bar{f}(z) = u(x, y) - iv(x, y)$

**Τότε**

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} u dx - v dy &\stackrel{\text{Λογ. II}}{=} \underline{\text{έργο}} \text{ του πεδίου } \bar{f} \text{ επί της καμπύλης } \gamma \\ \int_{\gamma} u dy + v dx &\stackrel{\text{Λογ. II}}{=} \underline{\text{ροή}} \text{ του πεδίου } \bar{f} \text{ διά μέσου της } \gamma \end{aligned}$$

### 3.1 Αντιπαράγωγος και ανεξαρτησία δρόμου

#### Ορισμός

Έστω  $f = f(z)$  είναι μια συνεχής μιγαδική συνάρτηση (μιγαδικής μεταβλητής) σε τόπο  $G \in \mathbb{C}$  (τόπος := ανοικτό και συνεκτικό σύνολο). Αν υπάρχει ολόμορφη συνάρτηση  $F = F(z)$ , έτσι ώστε:

$$F'(z) = f(z) \quad \forall z \in G, \text{ τότε η } F \text{ καλείται αντιπαράγωγος της } f.$$

#### Θεώρημα

Έστω  $f = f(z)$  είναι συνεχής μιγαδική συνάρτηση σε τόπο  $G$ . Οι ακόλουθες συνθήκες είναι ισοδύναμες:

- Η  $f$  έχει ΜΟΝΑΔΙΚΗ αντιπαράγωγο  $F$  (με προσέγγιση σταθεράς)
- $\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$ , για ΚΑΘΕ κλειστή λεία καμπύλη εντός του  $G$
- $\int_{\gamma} f(z) dz$  είναι ανεξάρτητο του δρόμου (δηλαδή εξαρτάται μόνον από το αρχικό και τελικό σημείο της  $\gamma$  και όχι από τον τύπο της  $\gamma$ )

Οι συνήθεις αντιπαράγωγοι εξακολουθούν να ισχύουν, π.χ.:

$$\int z^n dz = \frac{z^{n+1}}{n+1} + c, \quad \forall z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}$$

$$\int \frac{1}{z} dz = \text{Log} z + c, \quad \forall z \in \mathbb{C}^*$$

$$\int z^{-n} dz = \frac{z^{-n+1}}{-n+1} + c, \quad \forall n \in \mathbb{N} - \{1\}, c \in \mathbb{C} \text{ σταθερά}$$

$$\int \sin z dz = -\cos z + c$$

$$\int \cos z dz = \sin z + c$$

κλπ.

**π.χ.** Υπολογίστε το  $\int_{\gamma} ze^z dz$  επί της καμπύλης  $\gamma$  με τύπο  $\gamma = \gamma(t)$  και αρχή  $\gamma(a) = 1 + i$  και πέρας  $\gamma(b) = 1 - i$

$$\int ze^z dz = ze^z - \int e^z dz = \underline{ze^z - e^z}$$

οπότε:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} ze^z dz &= [ze^z - e^z]_{z_0=1+i}^{z_1=1-i} \\ &= e^{1-i}(1+i-1) - e^{1+i}(1+i-1) \end{aligned}$$

### 3.2 Θεώρημα Cauchy

#### Θεώρημα: Cauchy

Έστω  $f = f(z)$  είναι **ολόμορφη** συνάρτηση **πάνω** και στο **εσωτερικό απλής**, κλειστής και λείας καμπύλης  $\gamma$ .

Τότε:


$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

**Απόδ.** Έστω  $f = u + iv$ , όπου  $u = u(x, y)$  και  $v = v(x, y)$  έχουν συνεχείς μερικές παραγώγους πάνω και στο εσωτερικό της  $\gamma$ . Τότε:

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} f(z) dz &= \left( \oint_{\gamma} u dx - v dy \right) + i \left( \oint_{\gamma} u dy + v dx \right) \\ &\stackrel{\text{Θεώρ. Green}}{=} \iint_R (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_R (u_x - v_y) dx dy \end{aligned}$$

και επειδή η  $f$  ολόμορφη ικανοποιούνται οι συνθήκες Cauchy-Riemann  $\forall(x, y)$  στο εσωτερικό της  $\gamma$ , δηλαδή το  $R$ , άρα:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz \stackrel{\substack{u_x=v_y \\ u_y=-v_x}}{=} \iint_R 0 dx dy + i \iint_R 0 dx dy = 0$$




ροή του πεδίου  $\vec{f}$  διά μέσου της  $\gamma$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \underline{a} + i \underline{b}$$

έργο του πεδίου  $\vec{f}$  κατά μήκος  $\gamma$

( $\vec{f} \rightarrow$  ασυμπίεστο, αστρόβιλο ικανοποιούν εξίσωση Laplace  $u_{xx} + v_{yy} = 0$ )

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν υπάρχει έστω και ένα σημείο όπου η  $f$  δεν είναι μιγαδικά παραγωγίσιμη στο εσωτερικό της  $\gamma$ , τότε το **θεώρ. Cauchy δεν ισχύει εν γένει**.






$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} \stackrel{\gamma(t)=e^{it}}{=} \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{it}} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi i$$


### Θεώρημα: Παραμόρφωση δρόμων

Έστω  $f = f(z)$  είναι ολόμορφη σε τόπο  $G$  με σύνορο  $\partial G = \gamma_1 \cup \gamma_2$  όπου  $\gamma_1, \gamma_2$  απλές κλειστές καμπύλες, λείες, με κοινό προσανατολισμό π.χ. όπως στο σχήμα.



Τότε  $\oint_{\gamma_1} f(z) dz = \oint_{\gamma_2} f(z) dz$

**Απόδ.** Φέρνω δύο ευθ. τμήματα  $L_1$  και  $L_2$  που διαμερίζουν το  $G$  σε δύο χωρία έστω  $G_1, G_2$ . Τότε το  $\theta$ . Cauchy ισχύει και στο  $G_1$  και στο  $G_2$ .



•  $\int_{\gamma_1^+ + L_1 + \gamma_2^+ + L_2} f(z) dz = 0$  ( $\theta$ . Cauchy για το χωρίο  $G_1$ )


•  $\int_{\gamma_2^- - L_1 - \gamma_1^- - L_2} f(z) dz = 0$  ( $\theta$ . Cauchy για το χωρίο  $G_2$ )

$$\Rightarrow \begin{cases} \left( \int_{\gamma_1^+} + \int_{L_1} + \int_{\gamma_2^+} + \int_{L_2} \right) f(z) dz = 0 \\ \left( \int_{\gamma_2^-} - \int_{L_1} - \int_{\gamma_1^-} - \int_{L_2} \right) f(z) dz = 0 \end{cases} \Rightarrow \oint_{\gamma_1} f(z) dz - \oint_{\gamma_2} f(z) dz = 0$$

**Πόρισμα (Γενικευμένο θεώρ. Cauchy)** Έστω  $f = f(z)$  ολόμορφη σε τόπο  $G$  με σύνορο  $\partial G = \Gamma \cup (\gamma_1 \cup \dots \cup \gamma_n)$ , όπου:

- $\Gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$  απλές, κλειστές, λείες και ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ καμπύλες
- Οι  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$  βρίσκονται εντός της  $\Gamma$  και

- Κάθε καμπύλη  $\gamma_j$   $j = 1, \dots, n$  βρίσκεται εκτός των υπόλοιπων  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{i-1}, \gamma_{i+1}, \dots, \gamma_n$




$$\text{Τότε: } \oint_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \oint_{\gamma_j} f(z) dz$$

### Θεώρημα: Ολοκληρωτικός τύπος Cauchy

Έστω  $f = f(z)$  είναι ολόμορφη πάνω και στο εσωτερικό απλής, κλειστής, τμη. λείας και **ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗΣ** καμπύλης  $\gamma$ . Τότε **ΓΙΑ ΚΑΘΕ** σημείο  $z_0$  **ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ** της  $\gamma$  ισχύει:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

### Απόδειξη



Έστω  $|z - z_0| = r$  κύκλος ακτίνας  $r$  κατάλληλης ώστε ο δίσκος  $|z - z_0| \leq r$  να βρίσκεται εξ' ολοκλήρου στο εσωτερικό της  $\gamma$ .

Τότε από το θεώρημα παραμόρφ. δρόμων, εφ' όσον  $\frac{f(z)}{z - z_0}$  ολόμορφη στο γραμμοσκιασμένο χωρίο, έχουμε:

$$\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \underbrace{\oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz}_{I_2} + \underbrace{\oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz}_{I_1}$$

Για το  $I_2$  έχω:

$$I_2 = \oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz \stackrel{z=z_0+re^{i\theta}}{\theta \in [0, 2\pi]} = f(z_0) \int_0^{2\pi} \frac{1}{re^{i\theta}} rie^{i\theta} d\theta = 2\pi if(z_0)$$

$$\left( \begin{array}{l} l = l' \iff |l - l'| < \epsilon \forall \epsilon > 0 \\ \quad " \implies " \text{ προφ. ισχύει} \\ \quad " \iff " \text{ Έστω } l \neq l' \implies |l - l'| \geq \epsilon_0 > 0 \text{ άτοπο} \implies l = l' \end{array} \right)$$

Έτσι:

$$\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - 2\pi if(z_0) = I_1$$

$$|I_1| \leq \oint_{|z-z_0|=r} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} dz \leq M \cdot \oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{|z - z_0|} dz,$$

όπου  $M = \max \{|f(z) - f(z_0)| \mid \forall z : |z - z_0| = 1\}$

$$\begin{aligned} &= M \oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{r} |dz| \\ &= \frac{M}{r} \underbrace{\oint_{|z-z_0|=r} |dz|}_{\text{μήκος καμπύλης}} = \frac{2\pi M r}{r} = 2\pi M \end{aligned}$$

Αλλά  $f$  ολόμορφη στο  $z_0$ , άρα  $f$  συνεχής στο  $z_0$ .

Εξ' ορισμού λοιπόν:  $\forall \epsilon > 0 \exists r_1 > r > 0 : \forall z : 0 < |z - z_0| < r < r_1 \implies |f(z) - f(z_0)| < \epsilon$

Έτσι  $\forall \epsilon > 0$  μπορώ να βρω ακτίνα  $r : |f(z) - f(z_0)| \forall z : |z - z_0| = r$ , δηλ.  $M \leq \epsilon$  και τελικά

$$|I_1| \leq 2\pi M \leq 2\pi \epsilon \forall \epsilon > 0 \implies I_1 = 0$$

### Θεώρημα: Ολοκληρ. τύπος Cauchy για παραγώγους

Έστω  $f$  είναι ολόμορφη πάνω και στο εσωτερικό απλής, κλειστής, λείας και θετικά προσανατολισμένης καμπύλης  $\gamma$ .

Αν  $z_0$  σημείο στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ της  $\gamma$ , τότε η  $f$  ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ στο σημείο  $z_0$  και μάλιστα:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

Ο Ατρέας θα δίνει τύπους σε τυπολόγιο: <http://users.auth.gr/natreas/Efarmosmena/TYPOLOGIO.pdf>

## 3.3 Εφαρμογές

### (1) Θεώρ. μέσης τιμής Gauss

Αν  $f$  ολόμορφη πάνω και στο εσωτερικό θετικά προσανατολισμένου κύκλου  $|z - z_0| = R$ , τότε:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta$$

**Απόδειξη** Εφαρμόζω τον ολοκληρ. τύπο του Cauchy με τα δεδομένα μου και έχω:

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \\ &\stackrel{\text{ορισμός}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} d(z_0 + Re^{i\theta}) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} iRe^{i\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta = \text{ζητούμενο} \end{aligned}$$

- (2) **Ανισότητα Cauchy** Έστω  $f$  ολόμορφη πάνω και στο εσωτερικό θετικά προσανατολισμένου κύκλου  $|z - z_0| = R$  και  $M_R = \max \{|f(z)|, \forall z : |z - z_0| = R\}$

**Τότε:**

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M_R}{R^n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

**Απόδ.** Εφαρμόζουμε τον ολοκλ. τύπο Cauchy για παραγώγους προσαρμοσμένο στα δεδομένα:

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z_0)| &= \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right| \\ &\leq \frac{n!}{2\pi} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{|f(z)|}{|z-z_0|^{n+1}} |dz| \\ &\leq \frac{n!}{2\pi} M_R \oint_{|z-z_0|=R} \frac{1}{|z-z_0|^{n+1}} |dz| \\ &= \frac{n!}{2\pi} M_R \oint_{|z-z_0|=R} \frac{1}{R^{n+1}} |dz| \\ &= \frac{n!}{2\pi} M_R \frac{1}{R^{n+1}} \underbrace{\oint_{|z-z_0|=R} |dz|}_{\text{μήκος κύκλου } z-z_0=R} \\ &= \frac{n!}{2\pi} M_R \frac{1}{R^{n+1}} \cdot 2\pi R = \frac{n!M_R}{R^n} \end{aligned}$$

### (3) Θεώρ. Liouville

Κάθε **ακεραία** συνάρτηση (δηλ. ολόμορφη στο  $\mathbb{C}$ ) και φραγμένη στο  $\mathbb{C}$  είναι η σταθερή συνάρτηση.

**Απόδ.** Έστω  $z \in \mathbb{C}$  τυχαίο. Χρησιμοποιώ ανισότητα Cauchy για  $n = 1$ :

$$|f'(z)| \leq \frac{1!M_R}{R}, \quad M_R = \max \{|f(z)| : |z - z_0| = R\}$$

Αφού  $f$  εξ' υποθέσεως είναι φραγμένη, άρα  $\exists M > 0 : |f(z)| \leq M \quad \forall z \in \mathbb{C}$

$$\text{Δηλ. } |f'(z)| \leq \frac{M_R}{R} \leq \frac{M}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Τότε  $|f'(z)| = 0 \iff f'(z) = 0 \forall z \in \mathbb{C} \iff f(z) = c \in \mathbb{C}$

### (4) Αρχή μεγίστου/ελαχίστου

Έστω  $f$  ολόμορφη σε ανοικτό και συνεκτικό σύνολο  $G$  και μη σταθερή στο  $G$ . Τότε η  $|f|$  **ΔΕΝ** έχει μέγιστη τιμή στο  $G$ .

Αν μάλιστα  $f(z) \neq 0 \quad \forall z \in G$ , τότε η  $|f|$  **ΔΕΝ** έχει ελάχιστη τιμή στο  $G$ .

Ειδικά αν  $G$  είναι και **ΦΡΑΓΜΕΝΟ** και η  $f$  είναι συνεχής στο σύνορο του  $G$  (το οποίο είναι απλή, λεία καμπύλη), τότε η  $|f|$  **παίρνει ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΑΝΩ** στο **σύνορο** του  $G$ . Ομοίως αν  $f(z) \neq 0 \quad \forall z \in G$ , τότε η  $|f|$  παίρνει ελάχιστη τιμή ΠΑΝΩ στο **σύνορο** του  $G$ .

**Άσκ.** Υπολογίστε το  $\int_{\gamma} (i\bar{z} - z) dz$

όπου  $\gamma$  είναι η παραβολή  $y = 2t^2 + 1$  με αρχή το σημείο  $(1, 3)$  και πέρας το σημείο  $(2, 9)$ .

Γενικά, μπορώ να κινηθώ μέσω ορισμού, αντιπαραγώγου ή θεωρημάτων. Η  $\bar{z}$  δεν έχει παράγωγο, άρα δεν έχει αντιπαραγώγο (διαφορετικά από προηγούμενη εφαρμογή θα είχε άπειρες παραγώγους).

**Έχουμε:**

$$\int_{\gamma} (i\bar{z} - z) dz = i \int_{\gamma} \bar{z} dz - \int_{\gamma} z dz = I_1 + I_2$$

- όσον αφορά το  $I_2$ , εφ' όσον η  $f(z) = z$  είναι ολόμορφη στο  $\mathbb{C}$  ως πολυώνυμο, έχει μοναδική αντιπαραγώγο (με προσέγγιση σταθεράς), άρα:

$$\int_{\gamma} z dz = \frac{z^2}{2} \Big|_{z_0=1+3i}^{z_1=2+9i}$$

(αντιπαραγώγος  $\xrightarrow{\text{θεωρία}}$  ανεξαρτησία δρόμου)

$$\begin{aligned} &= \frac{(2+9i)^2}{2} - \frac{(1+3i)^2}{2} \\ &= \frac{69}{2} - 15i \\ &= B \end{aligned}$$

- Για το  $I_1$ :

$$\begin{aligned} I_1 &= i \int_{\gamma} \bar{z} dz \quad \text{ορισμός} \\ &\quad \text{διότι η } \bar{z} \text{ ΔΕΝ είναι παραγωγίσιμη σε κανένα σημείο} \\ &= i \int_1^2 \overline{t+i(2t^2+1)} d(t+i(2t^2+1)) \\ &= i \int_1^2 [t - i(2t^2+1)] \underbrace{[1+4ti] dt}_{\gamma'(t) dt := d\gamma(t)} \\ &= i \int_1^2 [t + 4t(2t^2+1)] + i[-1 - 2t^2 + 4t^2] dt \\ &= i \int_1^2 (5t + 8t^3) + i(2t^2 - 1) dt \\ &= i \left[ \frac{5t^2}{2} + 2t^4 \right]_1^2 - \left[ \frac{2t^3}{3} + t \right]_1^2 \\ &= A \end{aligned}$$

**Τελικά:**  $\int_{\gamma} (i\bar{z} - z) dz = A + B$


**Άσκ.** Υπολογίστε τα επικαμπύλια ολοκληρώματα

(α)  $\oint_{|z-\frac{1}{2}|=\frac{3}{2}} \frac{z \cos z}{2z+1} dz$

(β)  $\oint_{|z|=3} \frac{z^3+2}{(z-2)^3} dz$

(γ)  $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2-1} dz$

Όλες οι καμπύλες θεωρούνται προσανατολισμένες με τη θετική φορά.



Έστω  $f(z) = z \cos z$ , ολόμορφη στο  $\mathbb{C}$  άρα και πάνω και στο εσωτερικό του κύκλου

$$\left| z - \frac{1}{2} \right| = \frac{3}{2}$$

**Προφανώς:**


$$\begin{aligned} & \oint_{|z-\frac{1}{2}|=\frac{3}{2}} \frac{z \cos z}{2z+1} dz \\ &= \frac{1}{2} \oint_{|z-\frac{1}{2}|=\frac{3}{2}} \frac{z \cos z}{z - \left(-\frac{1}{2}\right)} dz, \end{aligned}$$

όπου  $z_0 = -\frac{1}{2} \in$  εσωτερικό του κύκλου  $|z - \frac{1}{2}| = \frac{3}{2}$ , ο οποίος είναι θετικά προσανατολισμένος.

Τότε ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες ώστε να έχω

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-\frac{1}{2}|=\frac{3}{2}} \frac{z \cos z}{z - \left(-\frac{1}{2}\right)} dz \\ &= |z \cos z|_{z_0=-\frac{1}{2}} \Rightarrow \oint_{|z-\frac{1}{2}|=\frac{3}{2}} \frac{z \cos z}{z + \frac{1}{2}} dz = 2\pi \left(-\frac{i}{2}\right) \cos\left(-\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

**Τελικά:**  $\boxed{\oint_{\gamma} \frac{z \cos z}{2z+1} dz = \frac{-\pi i}{2} \cos\left(-\frac{1}{2}\right)}$



Έστω  $g(z) = z^3 + 2$ , προφανώς ακεραία (ολόμορφη σε όλο το  $\mathbb{C}$ ), άρα ολόμορφη πάνω και στο εσωτερικό του κύκλου μας.

Επίσης,  $z_0 = 2 \in$  εσωτερικό του θετικά προσανατολισμένου κύκλου μας, άρα από τύπο Cauchy για παραγώγους έχουμε:


$$\begin{aligned} g''(2) &= \frac{2!}{2\pi i} \oint_{|z|=3} \frac{g(z)}{(z-2)^3} dz \quad (g(z) = z^3 + 2) \\ \Rightarrow \oint_{|z|=3} \frac{z^3 + 2}{(z-2)^3} dz &= \pi i \cdot g''(2) \end{aligned}$$

$$g'(z) = 3z^2$$

$$g''(z) = 6z$$

$$g''(2) = 12$$

**Τελικά:**  $\oint_{|z|=3} \frac{z^3 + 2}{(z-2)^3} dz = 12\pi i$




Χρησιμοποιώ κατ' αρχήν γενικευμένο θεώρημα Cauchy, και έχω:

$$\begin{aligned} I_{\zeta\eta\tau\omicron\mu\epsilon\nu\omicron} &= \oint_{\gamma_1} \frac{e^z dz}{(z-1)(z+1)} + \oint_{\gamma_2} \frac{e^z dz}{(z-1)(z+1)} \\ &= \oint_{\gamma_1} \frac{e^z/(z+1)}{z-1} dz + \oint_{\gamma_2} \frac{e^z/(z-1)}{z+1} dz \\ &\stackrel{\text{τύπος Cauchy}}{=} 2\pi i \frac{e^z}{z+1} \Big|_{z=1} + 2\pi i \frac{e^z}{z-1} \Big|_{z=-1} \\ &= \pi i e - \pi i e^{-1} \end{aligned}$$

(διότι οι αριθμητές  $\begin{cases} a(z) = \frac{e^z}{z+1} \\ b(z) = \frac{e^z}{z-1} \end{cases}$  είναι ολόμορφες συναρτήσεις πάνω και στο εσωτερικό των καμπύλων  $\gamma_1$  και  $\gamma_2$  αντιστοίχως και  $z_0 = 1 \in$  εσωτερικό της  $\gamma_1$  ενώ  $z_1 = -1 \in$  εσωτερικό  $\gamma_2$ )

**Θέμα:** Υπολογίστε το  $\oint_{|z|=R} \frac{1}{(z-i)^2} dz$  για όλες τις τιμές του  $R$ , όπου  $R > 0$  και  $R \neq 1$



(α)  $R < 1$

Τότε  $I = 0$  από θεώρ Cauchy αφού ανωμαλία  $z_0 = i$  εκτός κύκλου  $|z| = R$

(β)  $R > 1$

Τότε  $z_0 = i \in$  εσωτερικό κύκλου  $|z| = R$  οπότε χρησιμοποιώ τύπο Cauchy για παραγώγους και βρίσκω

$$I = 0.$$

**Άσκ.** Έστω  $f$  ολόμορφη πάνω και στο εσωτερικό κύκλου  $|z| = R$ , με  $f(z) \neq 0 \forall z$  στο εσωτερικό του κύκλου και  $f(z) = c$  για κάθε  $z$  πάνω στον κύκλο  $|z| = R$ .

ΝΔΟ  $|f'(z)| = A \geq 0 \forall z$  στο εσωτερικό του κύκλου.

Θα χρησιμοποιήσω αρχή μεγίστου/ελαχίστου, η οποία λέει ότι η  $|f(z)|$  παίρνει τόσο τη μέγιστη, όσο και την ελάχιστη τιμή της ΠΑΝΩ στον κύκλο  $|z| = R$ .

Εφ' όσον όμως  $f(z) = c \forall z : |z| = R$  τότε  $|f'(z)| = |c| = \text{σταθερό} \forall z$  πάνω στον κύκλο, όπου όμως η  $|f|$  παίρνει και μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Άρα η  $\max |f| = \min |f| \forall z : |z| = R$ , συνεπώς  $|f| = \text{σταθερά} \forall z$  στο εσωτερικό του κύκλου.

**Άσκ.** Έστω  $f$  ακεραία και  $|f'(z)| \leq A|z| \forall z \in \mathbb{C}$ . ΝΔΟ  $f(z) = cz$ , όπου  $c \in \mathbb{C}$  σταθερά.

Θα χρησιμοποιήσω ανισότητα Cauchy για  $n = 2$ , προσπαθώντας να δείξω ότι:

$$|f''(z)| = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

τότε  $f'(z) = c \implies f(z) = cz + d \quad c, d \in \mathbb{C}$ . Από υπόθεση, για  $z = 0$  έχω  $|f'(0)| \leq A \cdot 0 \implies f'(0) = 0$  άρα  $d = 0$ .

Ανισότητα Cauchy

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! \cdot M_R}{R^n} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

όπου  $M_R = \max \{|f(z)| : |z - z_0| = R\}$

Έτσι για  $n = 2$  έχω για  $z_0 \in \mathbb{C}$

$$|f''(z_0)| \leq \frac{2! \cdot M_R}{R^2} = \frac{2M_R}{R^2}$$

Για  $|z - z_0| = R$  δηλ. για  $z = z_0 + Re^{i\theta}$  έχω  $|f'(z)| \leq A|z| = A|z_0 + Re^{i\theta}| \leq A|z_0| + AR$

**Τότε:**

$$|f''(z_0)| \leq \frac{2(A|z_0| + AR)}{R^2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

άρα  $|f''(z_0)| = 0 \forall z_0 \in \mathbb{C}$ , άρα  $f''(z_0) = 0 \forall z_0 \in \mathbb{C}$ .

## Κεφάλαιο 4 Ολοκληρωτικά υπόλοιπα και εφαρμογές

### Ορισμός

Έστω  $f = f(z)$  μιγαδική συνάρτηση. Ένα σημείο  $z_0 \in \mathbb{C}$  καλείται **ΑΝΩΜΑΛΟ σημείο** της  $f$ , εάν είτε η  $f$  ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ στο  $z_0$ , είτε ορίζεται στο  $z_0$  αλλά δεν έχει "καλή συμπεριφορά" στο  $z_0$ , π.χ. δεν είναι ολόμορφη στο  $z_0$

- Αν  $z_0$  είναι ανώμαλο σημείο της  $f$ , τότε το  $z_0$  καλείται **ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ανώμαλο σημείο** της  $f$ , εάν η  $f$  είναι ολόμορφη στον Ανοικτό δακτύλιο


$$0 < |z - z_0| < R$$

για κάποιο  $R > 0$ , διαφορετικά το  $z_0$  καλείται ΜΗ απομονωμένο ανώμαλο σημείο.




π.χ.

- $f(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1}$  ( $z_0 = 1, z_0 = -1$ ) απομονωμένα ανώμαλα σημεία της  $f$



- $g(z) = \text{Log}z$  ( $z_0 = 0$ ) μη απομονωμένη ανωμαλία. Επίσης τα σημεία του αρνητικού ημιάξονα των πραγματικών είναι μη απομονωμένα ανώμαλα σημεία του λογαρίθμου



- $h(z) = \cos\left(\frac{1}{z}\right)$  ( $z_0 = 0$ ) το μοναδικό μεμονωμένο σημείο

Έστω  $z_0$  είναι **ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ** ανώμαλο σημείο μιας συνάρτησης  $f$ . Τότε υπάρχει κάποιος δακτύλιος

$$0 < |z - z_0| < R$$

όπου η  $f$  είναι ολόμορφη και η  $f$  αναπτύσσεται σε σειρά Laurent

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^k, \quad \forall 0 < |z - z_0| < R$$

**Δηλ.**

$$f(z) = \dots + \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} + \dots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \dots + a_n(z - z_0)^k + \dots$$

Θα λέμε ότι:

- Το  $z_0$  είναι **ΑΠΑΛΕΙΨΙΜΗ ανωμαλία**, εάν:

$$a_n = 0 \quad \forall n < 0$$

όπου  $a_n \in \mathbb{C}$  οι συντελεστές του αναπτύγματος Laurent της  $f$  "γύρω" από το  $z_0$ .

- π.χ.  $f(z) = \frac{\sin z}{z^2}$   $z_0 = 0$  (ανώμαλο σημείο)

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots$$

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \dots$$

$$\frac{\sin z}{z^2} = \frac{1}{z} - \frac{z}{3!} + \frac{z^3}{5!} - \frac{z^5}{7!} + \dots \quad \text{δεν είναι απαλείψιμη ανωμαλία στο } 0$$

- Το  $z_0$  καλείται **ΠΟΛΟΣ** της  $f$  τάξης  $k \in \mathbb{N}$ , εάν

$$a_n = 0 \quad \forall n < -k$$

Τότε το ανάπτυγμα Laurent της  $f$  γίνεται:

$$f(z) = \frac{a_{-k}}{(z-z_0)^k} + \frac{a_{-k+1}}{(z-z_0)^{k-1}} + \dots + a_0 + a_1(z-z_0) + \dots$$

Έτσι έχουμε:

$$f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^k} \underbrace{(a_{-k} + a_{-k+1}(z-z_0) + \dots + a_0(z-z_0)^k + \dots)}_{=g(z)}$$

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^k} \quad \forall 0 < |z-z_0| < R$$

όπου  $g = g(z)$  είναι ολόμορφη συνάρτηση στο  $z_0$  με  $g(z_0) \neq 0$ .

**Τελικά:** (εναλλακτικός ορισμός)

$z_0$  πόλος της  $f$  τάξης  $k \in \mathbb{N}$

↕

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^k} \text{ με } g \text{ κάποια ολόμορφη συνάρτηση στο } z_0 \text{ για την οποία } \boxed{g(z_0) \neq 0}$$

- Το  $z_0$  καλείται **ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑ** της  $f$ , εάν υπάρχει ΑΠΕΙΡΟ ΠΛΗΘΟΣ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ όρων  $a_n$  στο ανάπτυγμα Laurent της  $f$  ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ  $n$  να είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ.

**π.χ.** Τι είδους ανωμαλία είναι το σημείο  $z_0 = 1$  για τη συνάρτηση  $f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ ;

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2 - 1} &= \frac{1}{(z-1)(z+1)} \quad \text{αλλά} \quad \frac{1}{2} \left( \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{(z-1)+2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{z-1} - \frac{1}{4} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z-1}{2} \right)^n, \quad \left| \frac{z-1}{2} \right| < 1 \quad \left( \frac{1}{1-z} = \sum z^n \quad |z| < 1 \right) \\ \frac{1}{z^2 - 1} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z-1} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8}(z-1) - \frac{1}{16}(z-1)^2 + \dots \quad 0 < \left| \frac{z-1}{2} \right| < 1 \end{aligned}$$

Το  $z_0 = 1$  είναι πόλος 1<sup>ης</sup> τάξης εξ' ορισμού.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ** για ταξινόμηση **ΑΠΟΜΕΝΩΜΕΝΩΝ** ανώμαλων σημείων:

Έστω  $z_0$  είναι απομονωμένο ανώμαλο σημείο της  $f$ . Τότε:

- $z_0$  είναι απαλείψιμη ανωμαλία  $\iff$  υπάρχει το  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lambda \in \mathbb{C}$  (όχι το  $\infty$ )

- $z_0$  πόλος τάξης  $k \iff 0 < k \in \mathbb{N}$  ο μοναδικός φυσικός ώστε

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^k f(z) = \lambda \in \mathbb{C} - \{0\}$$

ΠΡΟΣΟΧΗ εδώ! Το όριο θέλω μη μηδενικό (επειδή μηδενίζεται για όλα τα επόμενα  $n > k$ )

- $z_0$  ουσιώδης ανωμαλία της  $f \iff$  Το  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  ΔΕΝ υπάρχει

**Τελικά:**

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \begin{cases} = \lambda \in \mathbb{C} & \implies z_0 \text{ απαλείψιμη ανωμαλία} \\ \infty & \implies z_0 \text{ πόλος} \\ \text{ΔΕΝ υπάρχει} & \implies z_0 \text{ ουσιώδης ανωμαλία} \end{cases}$$

#### 4.0.1 Πώς βρίσκουμε (κάποιες φορές) την τάξη ενός πόλου $z_0$

##### Λήμμα

Έστω  $f = f(z)$  ολόμορφη σε σημείο  $z_0$ . Τότε:

$$z_0 \text{ ρίζα της } f \text{ πολ/τας } \kappa \iff f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(\kappa-1)}(z_0) = 0 \text{ και } f^{(\kappa)}(z_0) \neq 0$$

##### Απόδειξη

"  $\Leftarrow$  " Αφού  $f$  ολόμορφη στο  $z_0$  **αναπτύσσεται ΠΑΝΤΑ** σε σειρά Taylor "γύρω" από το  $z_0$  ως εξής:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \\ &= \cancel{f(z_0)} + \cancel{f'(z_0)}(z - z_0) + \dots + \frac{f^{(k-1)}(z_0)}{(k-1)!} (z - z_0)^{k-1} + \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k + \dots \\ &= (z - z_0)^k \underbrace{\left( \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} + \frac{f^{(k+1)}(z_0)}{(k+1)!} + \dots \right)}_{=h(z)} \end{aligned}$$

$$f(z) = (z - z_0)^k h(z), \text{ όπου } h(z) \text{ ολόμορφη στο } z_0 \text{ με } h(z_0) \neq 0$$

"  $\Rightarrow$  " Τότε  $f(z) = (z - z_0)^k h(z)$ , όπου  $h$  ολόμορφη στο  $z_0$  με  $h(z_0) \neq 0$ . Παραγωγίζοντας  $k - 1$  φορές παίρνουμε  $f^{(j)}(z_0) = 0 \forall j = 0, 1, \dots, k - 1$ , ενώ  $f^{(k)}(z_0) \neq 0$ .

- Έστω τώρα  $f(z) = \frac{a(z)}{b(z)}$ , όπου  $a, b$  είναι ολόμορφες στο  $z_0$ . Υποθέτουμε ότι το  $z_0$  είναι ρίζα αριθμητή πολ/τας  $K$  ( $K = 0, 1, 2, \dots$ ) και ρίζα παρονομαστή πολ/τας  $\Lambda$  ( $\Lambda = 1, 2, 3, \dots$ ). Τότε:

$$z_0 \text{ είναι: } \begin{cases} \text{απαλείψιμη ανωμαλία για την } f & \text{εάν: } K \geq \Lambda \\ \text{πόλος τάξης } \Lambda - K & \text{εάν: } K < \Lambda \end{cases}$$

#### 4.0.2 Υπολογισμός ολοκληρωτικού υπολοίπου σε απομονωμένο ανώμαλο σημείο $z_0$

##### Ορισμός: Ολοκληρωτικό υπόλοιπο

Σειρά Laurent της  $f$  στο  $z_0$ :

$$f(z) = \dots + \frac{a_{-k}}{(z-z_0)^k} + \dots + \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + a_1(z-z_0) + \dots$$

Ο όρος  $a_{-1} = \oint_{\gamma} f(z) dz$  καλείται ολοκληρωτικό υπόλοιπο της  $f$  στο  $z_0$ , συμβολικά  $\text{Res}(f, z_0)$ .

Έστω  $z_0$  είναι απομονωμένο ανώμαλο σημείο συνάρτησης  $f$ .

- Αν  $z_0$  **απαλείψιμη ανωμαλία**, τότε το ολοκληρωτικό υπόλοιπο της  $f$  στο  $z_0$

$$\text{Res}(f, z_0) = 0$$

**Τελικά:**

$$z_0 \text{ απαλείψιμο} \Rightarrow \text{Res}(f, z_0) = 0$$

- Αν  $z_0$  είναι πόλος τάξης  $N$ , τότε το  $\text{Res}(f, z_0)$  βρίσκεται ως εξής:

Εφόσον  $z_0$  πόλος τάξης  $N$  έχουμε:

$$f(z) = \frac{a_{-k}}{(z-z_0)^k} + \frac{a_{-k+1}}{(z-z_0)^{k-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + a_1(z-z_0) + \dots$$

$$(z-z_0)^k f(z) = a_{-k} + a_{-k+1}(z-z_0) + \dots + a_{-1}(z-z_0)^{k-1} + a_0(z-z_0)^k + \dots$$

$$\Rightarrow \left( (z-z_0)^k f(z) \right)^{\overbrace{(k-1)}^{\text{η παράγωγος}}} = (k-1)!a_{-1} + a_0(k \dots 2)(z-z_0) + \dots$$

$$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} \left[ \left( (z-z_0)^k f(z) \right)^{(k-1)} \right] = (k-1)!a_{-1}$$

$$\Rightarrow a_{-1} \stackrel{\text{op.}}{=} \text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \left[ \left( (z-z_0)^k f(z) \right)^{(k-1)} \right]$$

**Προσοχή!** Το  $(k-1)$  είναι **ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ!**

- $z_0$  **ουσιώδης ανωμαλία**: Τότε **αναγκαστικά** θα πρέπει να βρείτε το ανάπτυγμα Laurent της  $f$  στο  $z_0$  και μέσω αυτού να υπολογίσετε τον όρο  $a_{-1} = \text{Res}(f, z_0)$

##### Θεώρημα: Ολοκληρωτικών υπολοίπων

Έστω  $f = f(z)$  είναι ολόμορφη πάνω και στο εσωτερικό απλής, κλειστής, τμημ. λείας και θετικά προσανατολισμένης καμπύλης  $\gamma$ , εκτός **ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ** σημείων  $z_1, \dots, z_n$  στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ της  $\gamma$ . Τότε:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res}(f, z_j)$$

### Θεώρημα: Αρχή ταυτισμού

Έστω  $f = f(z)$  είναι ολόμορφη πάνω και στο εσωτερικό απλής, κλειστής, τμηματικά λείας και θετικά προσανατολισμένης καμπύλης  $\gamma$ .

Αν  $\{z_\kappa\}_{\kappa \in \mathbb{Z}}$  ακολουθία σημείων στο εσωτερικό της  $\gamma$ , με  $z_\kappa \neq z_\lambda \quad \forall \kappa \neq \lambda$  και είναι τέτοια ώστε  $\lim_{\kappa \rightarrow \infty} z_\kappa = z_0$  ανήκει στο εσωτερικό της  $\gamma$ .

Τότε, εάν  $f(z_\kappa) = 0 \quad \forall \kappa$ , ισχύει:

$$f(z) = 0 \quad \forall z \text{ στο εσωτερικό της } \gamma$$

**Άσκηση** Να ταξινομηθούν όλα τα ανώμαλα σημεία των συναρτήσεων

(α)  $f(z) = \frac{1 - \cos(z)}{z^2}$

(β)  $g(z) = \frac{e^{z^2}}{z^3}$

(γ)  $h(z) = \frac{\cos(1/z)}{z}$

(δ)  $k(z) = \frac{z}{e^z - 1}$

και να υπολογιστούν τα ολοκληρωτικά υπόλοιπα στα σημεία αυτά.

(α) Ανώμαλα σημεία της  $f$  (σημεία όπου η  $f$ ) "πιθανώς" δεν ορίζεται ή αν ορίζεται δεν είναι μιγαδικά παραγωγίσιμη):

"Το μοναδικό ανώμαλο σημείο είναι αυτό που μηδενίζει τον παρονομαστή, δηλαδή το  $z_0 = 0$ ."

Προφανώς το  $z_0 = 0$  μηδενίζει τον παρονομαστή της  $f$  δύο φορές, δηλαδή το  $z_0 = 0$  είναι διπλή ρίζα του παρονομαστή.

**Έστω**

$$a(z) = \text{"αριθμητής"} = 1 - \cos(z), \quad a(0) = 1 - \cos(0) = 0$$

$$a'(z) = \sin(z), \quad a'(0) = 0$$

$$a''(z) = \cos(z), \quad a''(0) = 1 \neq 0$$

Άρα το  $z_0 = 0$  είναι **διπλή** ρίζα του αριθμητή.

Επομένως, το  $z_0 = 0$  είναι "απαλείψιμη ανωμαλία", διότι:

πολλαπλότητα ρίζας  $z_0 = 0$  του αριθμητή = 2  $\geq$  πολλαπλότητα ρίζας  $z_0 = 0$  του παρονομαστή = 2

Αφού το  $z_0 = 0$  είναι απαλείψιμη ανωμαλία:

$$\boxed{\text{Res}(f, 0) = 0}$$

(β) Το  $z_0 = 0$  είναι το μοναδικό ανώμαλο σημείο της  $g$ . Προφανώς η ρίζα του παρονομαστή είναι πολλαπλότητας 3. Το  $z_0 = 0$  δεν μηδενίζει τον αριθμητή, διότι  $e^{0^2} = 1 \neq 0$ , άρα η πολλαπλότητα του  $z_0 = 0$  για τον αριθμητή είναι ίση με 0 και έτσι το  $z_0 = 0$  είναι **πόλος**, τάξης:

$$\left. \begin{array}{l} \text{πολλαπλότητα ρίζας } z_0 = 0 \text{ του παρονομαστή} \\ - \\ \text{πολλαπλότητα ρίζας } z_0 = 0 \text{ του αριθμητή} \end{array} \right\} 3 - 0 = 3$$

Τότε:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(g, 0) &= \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \left( [z - 0]^3 \frac{e^{z^2}}{z^3} \right)'' \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \lim_{z \rightarrow 0} \left[ \left( e^{z^2} \right)'' \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \left( 2ze^{z^2} \right)' \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \left( 2e^{z^2} + 4z^2 e^{z^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 = 1\end{aligned}$$

(γ) Το μοναδικό άνωμαλο σημείο είναι το  $z_0 = 0$

### Σημείωση

Αν  $z_0$  είναι **πόλος** για συνάρτηση  $f$  και αν η  $g$  είναι ακεραία, τότε το  $z_0$  είναι ουσιώδης ανωμαλία για την  $g \cdot f$ .

Έτσι, με βάση τη σημείωση αυτή το  $z_0$  είναι ουσιώδης ανωμαλία.

Άρα:

$$\operatorname{Res}(h, 0) \stackrel{\text{ορισμός}}{=} a_1 \quad (\text{ο οποίος είναι συντελεστής του } \frac{1}{z-z_0} \stackrel{z_0=0}{=} \frac{1}{z}), \text{ στο ανάπτυγμα Laurent της } h \text{ με κέντρο το } z_0 = 0.$$

Επομένως:

$$\begin{aligned}\cos(z) &\stackrel{\text{McLaurin}}{=} 1 - \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{4!} - \dots \quad z \in \mathbb{C} \\ \cos\left(\frac{1}{z}\right) &= 1 - \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{24z^4} - \dots \quad z \in \mathbb{C} - \{0\} \\ \frac{1}{z} \cdot \cos\left(\frac{1}{z}\right) &= \frac{1}{z} - \frac{1}{2z^3} + \frac{1}{24z^3} - \dots \quad z \in \mathbb{C} - \{0\}\end{aligned}$$

Έτσι:

$$\operatorname{Res}(h, 0) = \text{"συντελεστής του } \frac{1}{z} \text{ στο ανάπτυγμα Laurent της } h" = 1.$$

(δ)  $k(z) = \frac{z}{e^z - 1}$

Σημεία που μηδενίζουν παρονομαστή

$$e^z = 1 \iff z = \operatorname{Log} 1 = \ln 1 + i(0 + 2n\pi) = 2n\pi i \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Άρα τα σημεία  $z_n = 2n\pi i \quad (n \in \mathbb{Z})$  άνωμαλα σημεία της  $k(z)$ .

Για  $n = 0$  έχουμε  $z_0 = 0$  ανώμαλο σημείο της  $k(z)$  που μηδενίζει τον παρονομαστή και αριθμητή 1 φορά άρα απαλείψιμο.

$$\text{Res}(k, 0) = 0$$

Για  $n \neq 0$  έχουμε  $z_n = 2n\pi i$  μηδενίζουν μια φορά παρονομαστή, καμία αριθμητή, άρα πόλοι 1ης τάξης.

Έτσι:

$$\begin{aligned} \text{Res}(k, z_n) &= \frac{1}{1} \lim_{z \rightarrow z_n} (z - z_n) k(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow z_n} (z - z_n) \frac{z}{e^z - 1} \stackrel{\text{L'Hosp.}}{=} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_n} \frac{z + z - z_n}{e^z} = \frac{z_n}{e^{z_n}} = \frac{2n\pi i}{e^{2n\pi i}} = 2n\pi i \end{aligned}$$

(2) Υπολογίστε το  $\oint_{|z|=3} \frac{e^z}{\cosh z} dz$

- (α) τύπος (θεώρ. ολοκλ. υπολοίπων)
- (β) ανώμαλα σημεία, θέλεις ΕΝΤΟΣ καμπύλης
- (γ) ταξινόμηση ανώμαλων
- (δ) υπολ.  $\text{Res}(f, z_j)$ ,  $z_j$  ανώμαλα

(α) Από θεωρία έχω:

$$I = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res} \left( \frac{e^z}{\cosh z}, z_j \right)$$

όπου  $z_j$  ανώμαλα σημεία εντός κύκλου:  $|z| = 3$

(β) Ανώμαλα σημεία της  $e^z/\cosh z$ :

$$\begin{aligned} \cosh z = 0 &\stackrel{\text{op.}}{\iff} \frac{e^z + e^{-z}}{2} = 0 \iff e^z + e^{-z} = 0 \\ e^z + \frac{1}{e^z} = 0 &\stackrel{\substack{z \neq 0 \\ \forall z}}{\iff} e^{2z} + 1 = 0 \iff e^{2z} = -1 \iff 2z = \text{Log} - 1 = \ln(1) + i(\pi + 2k\pi) \\ \implies &\boxed{z = \left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) i, \quad k \in \mathbb{Z}} \end{aligned}$$

$z = \frac{\pm\pi i}{2}, \frac{\pm 3\pi i}{2}, \frac{\pm 5\pi i}{2}$  ανώμαλα σημεία

Άρα μένουν οι  $z_1 = \frac{\pi i}{2}$  και  $z_2 = \frac{-\pi i}{2}$  βρίσκονται ΕΝΤΟΣ κύκλου  $|z| = 3$ .

Έτσι από θεώρημα ολοκλ. υπολοίπων έχουμε:

$$I = 2\pi i \left( \text{Res} \left( \frac{e^z}{\cosh z}, \frac{\pi i}{2} \right) + \text{Res} \left( \frac{e^z}{\cosh z}, \frac{-\pi i}{2} \right) \right)$$

(γ) Αλλά το  $z_1 = \frac{\pi i}{2}$  είναι πόλος 1<sup>ης</sup> τάξης, διότι

- μηδενίζει μια φορά τον παρονομαστή, αφού

$$A(z) = \cosh z, \quad \cosh\left(\frac{\pi i}{2}\right) = 0$$

$$A'(z) = \sinh z, \quad \sinh\left(\frac{\pi i}{2}\right) \neq 0$$

(τα μηδενικά του  $\sinh z$  είναι στα  $k\pi i$ )

και προφανώς δε μηδενίζει καθόλου τον αριθμητή, αφού

$$e^z \neq 0 \quad \forall z$$

άρα και

$$e^{\pi i/2} \neq 0$$

(δ) Ακριβώς με την ίδια λογική, το  $z_1 = -\frac{\pi i}{2}$  είναι πόλος 1<sup>ης</sup> τάξης.

•

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(\frac{e^z}{\cosh z}, \frac{\pi}{2}\right) &= \lim_{z \rightarrow \frac{\pi i}{2}} \left( \left(z - \frac{\pi i}{2}\right) \frac{e^z}{\cosh z} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \\ &= \lim_{z \rightarrow \frac{\pi i}{2}} \frac{e^z \left(z - \frac{\pi i}{2}\right) + e^z}{\sinh z} \\ &= \frac{e^{\pi i/2}}{\sinh\left(\frac{\pi i}{2}\right)} = \frac{e^{\pi i/2}}{i} = -e^{\pi i/2} i \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(\frac{e^z}{\cosh z}, -\frac{\pi i}{2}\right) &= \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi i}{2}} \left( \left(z + \frac{\pi i}{2}\right) \frac{e^z}{\cosh z} \right) \\ &= \frac{e^{-\pi i/2}}{\sinh\left(-\frac{\pi i}{2}\right)} = \frac{e^{-\pi i/2}}{-i} = e^{-\pi i/2} i \end{aligned}$$

(ε) Τελικά

$$I = 2\pi i \left( -e^{\pi i/2} i + e^{-\pi i/2} i \right) = 2\pi \left( e^{\pi i/2} - \frac{1}{e^{\pi i/2}} \right)$$

## 4.1 Εφαρμογές ολοκλ. υπολοίπων

### 4.1.1 Λήμμα Jordan

Έστω  $f = f(z)$  είναι ολόμορφη στο διάτρητο δίσκο

$$0 < |z - z_0| < R,$$

το  $z_0$  είναι **ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΟΣ** της  $f$  (δηλ. πόλος 1<sup>ης</sup> τάξης), και έστω  $\gamma_\rho$  είναι το τόξο  $\gamma_\rho := \{z : z = z_0 + \rho e^{i\theta}\}$  και  $\rho < R$ . Τότε:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_\rho} f(z) dz = i(\theta_1 - \theta_0) \operatorname{Res}(f, z_0)$$



**Απόδ.**

$$\int_{\gamma_\rho} f(z) dz = \int_{\gamma_\rho} \left( \frac{a_{-1}}{z - z_0} + h(z) \right) dz, \text{ όπου}$$

$h = h(z)$  ολόμορφη στο  $z_0$ , διότι το  $z_0$  είναι απλός πόλος της  $f$ .

$$\begin{aligned} I_0 &= a_{-1} \int_{\gamma_\rho} \frac{1}{z - z_0} dz + \int_{\gamma_\rho} h(z) dz \\ &= a_{-1} \int_{\theta_0}^{\theta_1} \frac{1}{\rho e^{i\theta}} i \rho e^{i\theta} d\theta + \int_{\gamma_\rho} h(z) dz \\ I_0(\rho) &= \text{Res}(f, z_0) \cdot i(\theta_1 - \theta_0) + \int_{\gamma_\rho} h(z) dz \end{aligned}$$

Παίρνοντας όριο,  $\rho \rightarrow 0^+$ , έχουμε:


$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_\rho} f(z) dz = i(\theta_1 - \theta_0) \text{Res}(f, z_0) + \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_\rho} h(z) dz$$

Αρκεί ΝΔΟ  $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_\rho} h(z) dz = 0$ .

Αλλά  $h$  ολόμορφη στο  $z_0 \Rightarrow h$  συνεχής στο  $z_0 \Rightarrow h$  φραγμένη σε μία περιοχή του  $z_0$ . Έτσι:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_\rho} \right| &\leq \int_{\gamma_\rho} |h(z)| |dz| \leq M \cdot \int_{\gamma_\rho} |dz| \\ &= (\theta_1 - \theta_0) \rho M \rightarrow 0, \end{aligned}$$

όπου  $M$  είναι άνω φράγμα της  $h$  σε μια περιοχή του  $z_0$ .



#### 4.1.2 Υπολογισμός περίπλοκων ολοκληρωμάτων της μορφής $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$

##### Θεώρημα

Έστω  $f = f(z)$  ολόμορφη στο  $\mathbb{C}$  εκτός από πεπερασμένου πλήθους απομονωμένα ανώμαλα σημεία, και η  $f$  τέτοια ώστε

$$\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) = 0.$$

Υποθέτουμε ότι η  $f$  έχει:

- ανώμαλα σημεία  $z_1, \dots, z_n$  ΣΤΟ ΑΝΩ ΗΜΙΕΠΙΠΕΔΟ  $\text{Im}(z) > 0$
- ανώμαλα σημεία  $w_1, \dots, w_k$  ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΗΜΙΕΠΙΠΕΔΟ  $\text{Im}(z) < 0$
- ΠΟΛΟΥΣ 1ης τάξης μόνον  $\zeta_1, \dots, \zeta_r$  πάνω στον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ.

Τότε:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx = 2\pi i \sum_{j=1}^n \overbrace{\text{Res}(f, z_j)}^{\text{άνω ημιεπίπεδο}} + \pi i \sum_{\lambda=1}^r \overbrace{\text{Res}(f, \zeta_\lambda)}^{\text{απλοί πόλοι πάνω στον πραγμ. άξονα}}$$

ή ισοδύναμα:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx = -2\pi i \sum_{\mu=1}^k \overbrace{\text{Res}(f, w_\mu)}^{\text{κάτω ημιεπίπεδο}} - \pi i \sum_{\lambda=1}^r \overbrace{\text{Res}(f, \zeta_\lambda)}^{\text{απλοί πόλοι πάνω στον πραγμ. άξονα}}$$


#### 4.1.3 Ασκήσεις

**Άσκ.** Υπολογίστε το  $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \frac{dx}{(x+1)(x^2+4x+5)^2}$   
 τέτοια ολοκληρώματα καλούνται καταχρηστικά ή κατά Cauchy

Το  $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$  δεν υπάρχει, επειδή

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x dx = \lim_{N, M \rightarrow \infty} \int_N^M x dx$$

που εξαρτάται από την διαδρομή που ακολουθούν τα  $M, N$ .



(α) Θεωρώ  $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z^2+4z+5)^2}$

(β) Ελέγχω αν ισχύει η συνθήκη

$$\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{(z+1)(z^2+4z+5)^2} &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z^5} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{z}\right) \left(1 + \frac{4}{z} + \frac{5}{z^2}\right)^2} \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^4} \cdot \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{z}\right) \left(1 + \frac{4}{z} + \frac{5}{z^2}\right)^2} = 0 \cdot 1 = 0 \end{aligned}$$

(γ) Υπολογίζω **όλα** τα ανώμαλα σημεία της  $f$  και τα ταξινομώ:

$$\begin{aligned} (z+1)(z^2+4z+5)^2 &= 0 \iff \\ \iff z_0 &= -1 \text{ (απλή ρίζα)} \quad \text{και } z_{1,2} = \frac{-4 \pm 2i}{2} \\ \iff z_0 &= -1 \text{ (απλή)} \quad \text{και } z_{1,2} = -2 \pm i \text{ (διπλές ρίζες)} \end{aligned}$$

**Έτσι:**

$$\begin{aligned} z_0 &= -1 \quad \text{(απλός πόλος στον πραγματικό άξονα)} \\ z_1 &= -2 + i \quad \text{(διπλός πόλος στο άνω ημιεπίπεδο)} \\ z_2 &= -2 - i \quad \text{(διπλός πόλος στο κάτω ημιεπίπεδο)} \end{aligned}$$

(δ) Τύπος:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx = \overbrace{+2\pi i \cdot \text{Res}(f, -2+i)}^{\text{ανώμαλο στο άνω ημιεπίπεδο}} + \pi i \text{Res}(f, -1)$$


(ε) Υπολογισμός ολοκλ. υπολοίπου

$$\begin{aligned} \bullet \text{Res}(f, -1) &= \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \frac{1}{(z+1)(z^2+4z+5)^2} = \frac{1}{4} \\ \bullet \text{Res}(f, z_1) &= \lim_{z \rightarrow z_1} \left( (z-z_1)^2 \frac{1}{(z+1)(z-z_1^2)(z-z_2)^2} \right)' \\ &\text{όπου } z_1 = -2+i, z_2 = -2-i \\ &= \lim_{z \rightarrow z_1} \left( \frac{1}{(z+1)(z-z_2)^2} \right)' = - \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{(z-z_2)^2 + 2(z+1)(z-z_2)}{(z+1)^2(z-z_2)^4} \\ &= - \frac{(z_1-z_2) + 2(z_1+1)}{(z_1+1)^2(z_1-z_2)^3} \\ z_1-z_2 &= \cancel{-2}+i+\cancel{2}+i \\ &= - \frac{2i + 2(i-1)}{(i-1)^2(2i)^3} = \frac{4i-2}{+2 \cdot 8} \\ &= \boxed{\frac{2i-1}{8}} \end{aligned}$$

(ϐ) Τελικό αποτέλεσμα

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \frac{dx}{(x+1)(x^2+4x+5)^2} &= 2\pi i \cdot \frac{2i-1}{8} + \pi i \cdot \frac{1}{4} \\ &= -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi i}{4} + \frac{\pi i}{4} = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

**Άσκ.** Υπολογίστε το  $\oint_{\gamma} \frac{1}{z(z-z_1)^2} dz$ , όπου  $\gamma$  είναι το τετράγωνο:



με θετική

φορά.

Εφαρμόζω θεώρ. ολοκλ. υπολοίπων

$$I = 2\pi i \cdot \text{Res} \left( f, \begin{array}{l} \text{στα ανώμαλα σημεία} \\ \text{ΕΝΤΟΣ τετραγώνου} \end{array} \right) + i \frac{\pi}{2} \overset{\text{πάνω στην καμπύλη}}{\text{Res}(f, \tilde{0})}$$

$$\bullet \text{Res}(f, 0) \stackrel{\substack{z=0 \text{ απλός} \\ \text{πόλος}}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{1}{z(z-z_1)^2} = \frac{1}{z_1^2}$$

$$\bullet \text{Res}(f, z_1) \stackrel{\substack{\text{δευτέρης} \\ \text{πόλος}}}{=} \lim_{z \rightarrow z_1} \left( (z-z_1)^2 \frac{1}{z(z-z_1)^2} = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{1}{z^2} = -\frac{1}{\left(\frac{1}{2} + i\frac{1}{2}\right)} \right)$$

Αντικαθιστώντας παραπάνω προκύπτει το ζητούμενο αποτέλεσμα.

#### 4.1.4 Υπολογισμός ολοκληρωμάτων της μορφής $\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta$

όπου  $R$  είναι μια ρητή συνάρτηση των  $\sin \theta$  και  $\cos \theta$

**Μεθοδολογία:** Θέτουμε  $z = e^{i\theta}$ ,  $\theta \in [0, 2\pi)$

Τότε:

$$dz = d(e^{i\theta}) = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta$$

$$\text{άρα } \boxed{dz = iz d\theta}$$

$$\text{Επίσης: } \begin{cases} \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z} \\ \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i} = \frac{z^2 - 1}{2iz} \end{cases}$$

Αντικαθιστούμε τα παραπάνω και παίρνουμε:

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2 - 1}{2iz}, \frac{z^2 + 1}{2z}\right) \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} K(z) dz,$$

όπου  $K$  είναι μια ρητή συνάρτηση του  $z$ . Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το θ. ολοκλ. υπολοίπων, και έχουμε:

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res}(K, z_j),$$

όπου  $z_j, j=1, \dots, n$  ανώμαλα σημεία της  $K$  εντός του μοναδιαίου κύκλου  $|z| = 1$ .

**Παράδειγμα:** Υπολογίστε το  $\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{2 + \sin \theta} d\theta$

(α) Θέτω  $z = e^{i\theta}$ ,  $\theta \in [0, 2\pi)$

Τότε

$$dz = d(e^{i\theta}) = ie^{i\theta} d\theta = iz dz$$

άρα  $dz = iz d\theta$

$$\begin{aligned} \bullet \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i} = \frac{z^2 - 1}{2iz} \\ \bullet \cos(2\theta) &= \frac{e^{i2\theta} + e^{-i2\theta}}{2} \stackrel{z=e^{i\theta}}{=} \frac{z^2 + z^{-2}}{2} = \frac{z^4 + 1}{2z^2} \end{aligned}$$

Τότε

$$\begin{aligned} I &= \oint_{|z|=1} \frac{\frac{z^4+1}{2z^2}}{2 + \frac{z^2-1}{2iz}} \frac{dz}{iz} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{z^4 + 1}{z^2(z^2 + 4iz - 1)} dz \end{aligned}$$

(β) Ανώμαλα σημεία: Εκείνα που μηδενίζουν τον παρονομαστή. Άρα

$$z^2(z^2 + 4iz - 1) = 0 \iff$$

$$z = 0 \text{ (διπλή)} \quad \text{ή} \quad z_{1,2} = \frac{-4i \pm \sqrt{16i^2 + 4}}{2} = -2i \pm i\sqrt{3} = i(-2 \pm \sqrt{3})$$

Από αυτά με ενδιαφέρουν μόνον τα ανώμαλα σημεία ΕΝΤΟΣ του μοναδιαίου κύκλου, δηλ.:

$$z_0 = 0 \text{ (διπλή)}$$

$$z_1 = i(-2 + \sqrt{3})$$

(γ) Ταξινόμηση ανώμαλων σημείων και υπολογισμός ολοκληρωτικών υπολοίπων

$z_0 = 0$  είναι πόλος 2<sup>ης</sup> τάξης (μηδενίζει δύο φορές τον παρονομαστή, καμία τον αριθμητή)

$z_1 = i(-2 + \sqrt{3})$  πόλος 1<sup>ης</sup> τάξης

$$\text{Ο τύπος } \text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(N-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} ((z - z_0)^N f(z))^{(N-1)} \text{ θα δίνεται}$$

και έτσι αν  $f(z) = (z^4 + 1)/z^2(z^2 + 4iz - 1)$ , τότε

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, 0) &= \lim_{z \rightarrow 0} \left( z^2 \frac{z^4 + 1}{z^2(z^2 + 4iz - 1)} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{4z^3(z^2 + 4iz - 1) - (2z + 4i)(z^4 + 1)}{(z^2 + 4iz - 1)^2} \\ &= -4i \end{aligned}$$

Έστω  $z_1 = i(-2 + \sqrt{3})$  και  $z_2 = i(-2 - \sqrt{3})$ . Τότε

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f, z_1) &= \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z^4 + 1}{z^2(z - z_1)(z - z_2)} \\ &= \frac{z_1^4 + 1}{z_1^2(z_1 - z_2)} \\ &= \frac{(\sqrt{3} - 2)^4 + 1}{-(\sqrt{3} - 2)^2 \cdot i2\sqrt{3}} = i \frac{(\sqrt{3} - 2)^4 + 1}{2\sqrt{3}(\sqrt{3} - 2)^2} \end{aligned}$$

(δ) Τελικά από θεώρημα ολοκλ. υπολοίπων έχω:

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i \left( -4i + i \frac{(\sqrt{3} - 2)^4 + 1}{2\sqrt{3}(\sqrt{3} - 2)^2} \right) \\ &= 8\pi - \pi \cdot \frac{(\sqrt{3} - 2)^4 + 1}{\sqrt{3}(\sqrt{3} - 2)^2} \end{aligned}$$

#### 4.1.5 Υπολογισμός μετασχηματισμού Fourier τοπικά ολοκληρώσιμης συνάρτησης $f$

$$\hat{f}(\omega) = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) e^{-i\omega x} dx$$

όπου  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\omega \in \mathbb{R}$

#### Θεώρημα

Έστω  $f = f(z)$  είναι ολόμορφη στο  $\mathbb{C}$  εκτός πεπερασμένου πλήθους απομονωμένων ανώμαλων σημείων και η  $f$  έτσι ώστε:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$$

Υποθέτουμε ότι:

- (α) Η  $f$  έχει ανώμαλα σημεία  $z_1, \dots, z_n$  στο ΑΝΩ ΗΜΙΕΠΙΠΕΔΟ  $\operatorname{Im}(z) > 0$
- (β) Η  $f$  έχει ανώμαλα σημεία  $w_1, \dots, w_m$  στο ΚΑΤΩ ΗΜΙΕΠΙΠΕΔΟ  $\operatorname{Im}(z) < 0$
- (γ) Η  $f$  έχει **ΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ**  $\zeta_1, \dots, \zeta_r$  πάνω στον **πραγματικό άξονα**.

Τότε

(α) Αν  $\omega < 0$ , έχουμε:

$$\hat{f}(\omega) = 2\pi i \sum_{j=1}^n \operatorname{Res}(f(z)e^{-i\omega z}, z_j) + \pi i \sum_{\mu=1}^r \operatorname{Res}(f(z)e^{-i\omega z}, \zeta_\mu)$$

(β) Αν  $\omega > 0$ , έχουμε:

$$\hat{f}(\omega) = -2\pi i \sum_{\lambda=1}^m \operatorname{Res}(f(z)e^{-i\omega z}, w_\lambda) - \pi i \sum_{\mu=1}^r \operatorname{Res}(f(z)e^{-i\omega z}, \zeta_\mu).$$

**Άσκ.** Υπολογίστε το  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(kx)}{x^2 + 1} dx \quad (k \in \mathbb{Z}^*)$

Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω  $e^{-ikx}$  και μετασχηματισμό Fourier.

- Ορίζω  $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$

- Προφανώς:  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^2 + 1} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{z^2}} = 0 \cdot 1 = 0$

- Ανώμαλα σημεία της  $f$ : αυτά που μηδενίζουν παρονομαστή, άρα:

$$z^2 + 1 = 0 \iff \boxed{z = \pm i},$$

τα οποία είναι προφανώς απλοί πόλοι.

- Χωρίς περιορισμό γενικότητας, εργαζομαι μόνον για  $k > 0$  (διότι λόγω  $\cos$  που είναι άρτια συνάρτηση ισχύει  $I_{-k} = I_k \quad (k > 0)$ ).

Τότε, από θεωρία:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) e^{-ikx} dx = -2\pi i \cdot \text{Res}(f(z)e^{-ikz}, -i)$$

- Αλλά:

$$\begin{aligned} \text{Res}(f(z)e^{-ikz}, -i) &= \lim_{z \rightarrow -i} (z + i) \frac{e^{-ikz}}{z^2 + 1} \\ &= \lim_{z \rightarrow -i} \frac{e^{-ikz}}{z - i} = \frac{e^{-k}}{-2i} = i \frac{e^{-k}}{2} \end{aligned}$$

**Τελικά:**

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) e^{-ikx} dx &= -2\pi i \cdot i \frac{e^{-k}}{2} = \pi e^{-k} \\ \implies \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) \cos(kx) dx - i \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) \sin(kx) dx &= \pi e^{-k} - 0 \\ \implies \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) \cos(kx) dx &= \pi e^{-k} \quad (k > 0) \end{aligned}$$

Εφόσον  $I_{-k} = I_k$ , τελικά:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(kx) dx = \pi e^{-k} \quad \forall k \in \mathbb{Z}^*$$

Αν ήθελα να υπολογίσω το  $\int_{\mathbb{R}} \left( \frac{\cos(kx)}{x^2 + 1} \right)$ , με  $f(z) = \frac{\cos(kz)}{z^2 + 1}$ , παρατηρώ ότι  $\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) \neq 0$ .

#### 4.1.6 Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace

Είναι γνωστό ότι αν  $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$  είναι τμηματικά συνεχής στο  $[0, b] \quad \forall b > 0$  και εκθετικής τάξης  $a \in \mathbb{R}$ , δηλ.

$$|f(t)| \leq Ce^{at} \quad \forall t > b,$$

όπου  $b, c > 0$ , τότε ορίζεται ο μετασχηματισμός Laplace ως εξής:

$$F(z) = \mathcal{L}\{f\}(z) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-zt} dt \quad \forall z : |z| > a$$

Τότε:  $\lim_{z \rightarrow \infty} F(z) = 0$

### Θεώρημα: Αντιστροφή Laplace

Έστω  $F = F(z)$  είναι ο μετασχ. Laplace συνάρτησης  $f$ , και έστω ότι η  $F$  είναι ολόμορφη στο  $\mathbb{C}$ , εκτός πεπερασμένου πλήθους απομονωμένων ανώμαλων σημείων  $z_1, \dots, z_n$  (και φυσικά  $\lim_{z \rightarrow \infty} F(z) = 0$ ).

Τότε για οποιοδήποτε  $\gamma \in \mathbb{R}$ , τέτοιο ώστε όλα τα ανώμαλα σημεία της  $F$  βρίσκονται στα αριστερά της κατακόρυφης ευθείας  $\gamma + it$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , έχουμε:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi i} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma - iR}^{\gamma + iR} F(z)e^{zt} dz \quad (t \geq 0) \\ &= \sum_{j=1}^n \text{Res}(F(z)e^{zt}, z_j) \end{aligned}$$

**π.χ.** Βρείτε τον αντίστροφο μετασχ. Laplace της  $F(z) = \frac{z}{(z+4)(z-1)}$  ( $|z| > 1$ )

• Προφανώς  $\lim_{z \rightarrow \infty} = 0$

• Έχω δύο ανώμαλα σημεία  $z = -4$ ,  $z = 1$  που είναι απλοί πόλοι

Τότε:

$$f(t) = \text{Res}(F(z)e^{zt}, -4) + \text{Res}(F(z)e^{zt}, 1)$$

• **Αλλά:**

$$- \text{Res}(F(z)e^{zt}, 4) = \lim_{z \rightarrow -4} \frac{(z-4)e^{zt} \cdot z}{(z+4)(z-1)} = \frac{4e^{-4t}}{5}$$

$$- \text{Res}(F(z)e^{zt}, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{zt} \cdot z}{(z+4)(z-1)} = \frac{e^t}{5}$$

• **Τελικά:**

$$f(t) = \frac{e^t}{5} + \frac{4e^{-4t}}{5}$$

**Άσκ.** Αν  $z_0$  πόλος της  $f = f(z)$  τάξης  $N$ , ΝΔΟ  $z_0$  πόλος της  $f'$  τάξης  $N + 1$

Θα χρειαστούμε τον ορισμό του πόλου.

Αφού  $z_0$  πόλος της  $f$  τάξης  $N$ , τότε, εξ' ορισμού:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{h(z)}{(z-z_0)^N}, \text{ όπου } h(z) \text{ ολόμορφη στο } z_0 \text{ με } h(z_0) \neq 0 \\ f'(z) &= \frac{h'(z)(z-z_0)^N - N(z-z_0)^{N-1}h(z)}{(z-z_0)^{2N}} \\ &= \frac{h'(z)(z-z_0) - Nh(z)}{(z-z_0)^{N+1}}, \end{aligned}$$



άρα  $z_0$  πόλος τάξης  $N + 1$  της  $f'$ , διότι μηδενίζει  $N + 1$  φορές παρονομαστή (το  $z_0$ ) ενώ δε μηδενίζει αριθμητή, εφόσον

$$h'(z_0)(z_0 - z_0) - Nh(z_0) = -Nh(z_0) \neq 0$$

(αφού  $h(z_0) \neq 0$ )

**Άσκ.** Υπολογίστε το  $I = \int_{|z+2|=1} (z-3) \sin\left(\frac{1}{z+2}\right) dz$

Επειδή το ολοκλήρωμα δεν είναι στο  $\infty$ , δεν χρησιμοποιώ Fourier/Laplace, απλώς το θεώρημα ολοκληρωτικών υπολοίπων.

- Από θεωρ. υπολοίπων:

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res}\left(f, z_j \text{ όλα τα ανώμαλα εντός κύκλου}\right) \\ &= 2\pi i \text{Res}(f, -2), \end{aligned}$$

διότι  $-2$  ανήκει στον κύκλο  $|z+2|=1$ .

- Ταξινόμηση του  $z_0 = -2$ .

Το  $z_0 = -2$  ουσιώσης ανωμαλία (σύνθεση ολόμορφης - της  $\sin z$  - με την  $\frac{1}{z+2}$  που έχει απλό πόλο. Εμπειρικά τότε η  $\sin\left(\frac{1}{z+2}\right)$  έχει ουσιώδη ανωμαλία στο  $z_0 = -2$ )

- Υπολογισμός υπολοίπου Αφού  $z_0 = -2$  ουσιώδες ανώμαλο σημείο της  $(z-3) \sin\left(\frac{1}{z+2}\right)$ , αναπτύσσω σε σειρά Laurent.

$$\begin{aligned} \text{Θέτω } z+2 = u, \text{ τότε: } (z-2) \sin\left(\frac{1}{z+2}\right) &= (u-5) \sin\left(\frac{1}{u}\right) \stackrel{\text{τύπος}}{=} (u-5) \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{3!u^3} + \frac{1}{5!u^5} - \dots\right) = \\ 1 - \frac{1}{3!u^2} + \frac{1}{5!u^4} - \dots - \frac{5}{u} + \frac{5}{6u^3} - \frac{1}{24u^5} + \dots &= 1 - \frac{5}{u} - \frac{1}{6u^2} - \dots = 1 - \frac{5}{z+2} - \dots \end{aligned}$$

Θα δίνονται τύποι μερικών γνωστών σειρών McLaurin στο τυπολόγιο.

**Εξ' ορισμού:**  $\text{Res}(f, -z) = -5$ .

Τελικά:

$$I = 2\pi i(-5) = -10\pi i$$

## Μέρος II

# Κεχαγιάς

Σπιτεργασίες λιγότερες από πέρσι, για 1 βαθμό, αφορούν μόνο το μέρος του Κεχ.

1. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
3. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, ΣΕΙΡΕΣ
4. ΔΥΝΑΜΟΣΕΙΡΕΣ
5. ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
6. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ με μερικές παραγώγους

## Κεφάλαιο 5 Μιγαδικοί αριθμοί

$$z = x + iy \in \mathbb{C}$$

$$x, y \in \mathbb{R} \quad i^2 = -1$$

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2)$$

$$= x_1x_2 + iy_1y_2 + ix_1y_2 + ix_2y_1$$

$$= (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)}$$


$$= \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{-x_1y_2 + x_2y_1}{x_2^2 + y_2^2}$$

$$z = x + iy$$

$$\bar{z} = x - iy$$

$$\operatorname{Re}(z) = x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{Im}(z) = y \in \mathbb{R}$$



$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}} = |z| \leftarrow \text{μέτρο του } z$$

γενίκευση της απόλυτης τιμής (δηλ.  $z = x \in \mathbb{R}$ ,  $|z| = \sqrt{x^2} = |x|$ )


$$\begin{aligned} z = x + iy &= r \cdot \cos \theta + ir \sin \theta \\ &= r(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= r \cdot e^{i\theta} \quad (\text{Euler}) \end{aligned}$$

$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  διότι

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \dots \\ &= \left( 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots \right) + i \left( \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

Επίσης:

$$\begin{aligned} z &= x + iy \\ &= \sqrt{x^2 + y^2} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + i \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \\ &= r \cdot (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= r \cos \theta + ir \sin \theta \end{aligned}$$



$$z_1 = 1 + i = \sqrt{2} \cdot e^{i\pi/4}$$

$$r_1 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\theta_1 = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}$$

$$z_2 = -1 - i = \sqrt{2}e^{i5\pi/4} = \sqrt{2}e^{i(-3\pi/4)} = \sqrt{2}e^{i13\pi/4}$$

$$r_2 = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\theta_2 = \arctan \frac{-1}{-1} = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Γενικά: } -1 - i = \sqrt{2}e^{i(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

## 5.1 Συναρτήσεις

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$z = x + iy$$

$$\text{mod}(z) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \theta_0 & \text{αν } z \in 1^\circ \text{ τεταρτημόριο} \\ \pi - \theta_0 & \text{αν } z \in 2^\circ \text{ τεταρτημόριο} \\ \pi + \theta_0 & \text{αν } z \in 3^\circ \text{ τεταρτημόριο} \\ 2\pi - \theta_0 & \text{αν } z \in 4^\circ \text{ τεταρτημόριο} \end{cases} \quad \theta_0 = \arctan \left( \left| \frac{y}{x} \right| \right)$$

$$\forall z \in \mathbb{C} - \{0\} \quad \text{Arg}(z) \in [0, 2\pi)$$

Ορίζω και την πλειότιμη συνάρτηση  $\arg(z) = \{\text{Arg}(z) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

$$\begin{aligned} z = x + iy &= \text{mod}(z) \cdot e^{i \text{Arg}(z)} \\ &= \text{mod}(z) \cdot e^{i(\text{Arg}(z) + 2k\pi)} \end{aligned}$$

$$z_1 = \text{mod}(z_1) e^{i \text{Arg}(z_1)}$$

$$z_2 = \text{mod}(z_2) e^{i \text{Arg}(z_2)}$$

$$z_1 z_2 = \text{mod}(z_1) \text{mod}(z_2) e^{i(\text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2))}$$

$\text{Arg}(z_1 z_2) \neq \text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2)$  επειδή

$$\text{Arg} \left( e^{i\frac{7\pi}{4}} e^{i\frac{7\pi}{4}} \right) = \frac{7\pi}{4} + \frac{7\pi}{4} - 2\pi$$

Γενικά, αν  $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$ , τότε:

$$\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

Όμως:

$$\begin{aligned} \arg(z^2) &= \arg(z) + \arg(z) \\ &\neq 2\arg(z) \end{aligned}$$

διότι:

$$A = \{a_1, a_2, \dots\}$$

$$B = \{b_1, b_2, \dots\}$$

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$$

$$A + A = \{a_1 + a_2 : a_1, a_2 \in A\}$$

$$2A = \{2a : a \in A\}$$

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{4, 5\}$$

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\} = \{1 + 4, 1 + 5, 2 + 4, 2 + 5, 3 + 4, 3 + 5\} = \{5, 6, 7, 8\}$$

$$A + A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$2A = \{2, 4, 6\}$$

## 5.2 n-οστές ρίζες

$$z = a^{1/n} \iff z^n = a$$

Δηλ. ποιο  $z$  ικανοποιεί αυτή


$$a = |a|e^{i\theta}$$

$$z = re^{i\phi}$$

$$\begin{aligned} (re^{i\phi})^n &= |a|e^{i\theta} \\ \implies r^n \cdot e^{in\phi} &= |a|e^{i\theta} \\ \implies r^n \cdot (\cos n\phi + i \sin n\phi) &= |a| \cdot (\cos \theta + i \sin \theta) \\ \implies \begin{cases} r^n = |a| \implies r = \sqrt[n]{|a|} \\ \cos(n\phi) = \cos \theta \\ \sin(n\phi) = \sin \theta \end{cases} &\implies n\phi = \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \implies \phi = \frac{\theta + 2k\pi}{n} \\ \implies z = a^{1/n} &= \sqrt[n]{|a|} \cdot e^{i(\theta + 2k\pi)/n}, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

(Όμως αρκεί να πάρω  $k \in \{0, 1, \dots, N - 1\}$ )

$$a^{1/n} = \left\{ \sqrt[n]{|a|}e^{i\theta/n}, \sqrt[n]{|a|}e^{i\frac{\theta+2\pi}{n}}, \dots \right.$$




**Παρ.**  $a^{1/2} = 1^{1/2}$

$$a = 1 = 1 \cdot e^{i0} \quad |a| = 1, \theta = 0$$

$$u_0 = \sqrt[2]{1} \cdot e^{i\left(\frac{0+2\cdot 0\cdot\pi}{2}\right)} = e^{i0} = 1$$

$$u_1 = \sqrt[2]{1} \cdot e^{i\left(\frac{0+2\cdot\pi}{2}\right)} = e^{i\pi} = -1$$




**Παρ.**  $a^{1/3} = 1^{1/3} = z$

$$a = 1 = e^{i0}, |a| = 1, \theta = 0$$

$$u_0 = 1$$

$$u_1 = e^{i2\pi/3} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$$

$$u_2 = e^{i4\pi/3} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$$




### Διαφορετικά

$$\begin{aligned}
 1^{1/3} = z &\iff 1 = z^3 \\
 &\iff z^3 - 1 = 0 \\
 &\iff (z - 1)(z^2 + z + 1) = 0 \\
 &\iff (z - 1) \left( z + \frac{1 - i\sqrt{3}}{2} \right) \left( z + \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \right) = 0
 \end{aligned}$$

Παρ.  $1^{1/11} = z \iff 1 = z^{11}$

$$\begin{aligned}
 &\iff z^{11} - 1 = 0 \\
 &\iff (z - 1)(z^{10} + z^9 + \dots + z^2 + z + 1) = 0
 \end{aligned}$$

$$\{u_0, u_1, \dots, u_{10}\}$$



## Κεφάλαιο 6 Βασικές μιγαδικές συναρτήσεις

$$e^z, \log(z)$$

### 6.1 Εκθετική συνάρτηση

$$e^z \stackrel{\text{ορισμός}}{=} e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

Ήξερα  $e^x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $e^{iy} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  .

Τώρα η νέα συνάρτηση  $e^z : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  και **γενικεύει** τις δύο προηγούμενες συναρτήσεις.

**Παρ.**

$$\begin{aligned} e^{1+i} &= ee^i = e \cdot (\cos 1 + i \sin 1) \\ &= e \cdot \cos 1 + i \cdot e \cdot \sin 1 \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(e^{1+i}) = e \cos 1$$

$$\operatorname{Im}(e^{1+i}) = e \sin 1$$

$$\log(e) = 1$$

$$\log(-1) = \log(e^{i(\pi+2k\pi)}) = i(\pi + 2k\pi)$$

Δηλ. η λογαριθμική συνάρτηση είναι **πλειότιμη**.

$$z = |z|e^{i\theta}$$

$$\log(z) = \ln(|z|) + i\theta$$

**Ορίζω**

**Την πλειότιμη λογαριθμική**  $\log(z) = \ln(|z|) + i\arg(z)$

**Τη μονότιμη λογαριθμική**  $\operatorname{Log}(z) = \ln(|z|) + i \operatorname{Arg}(z)$  είναι ο πρωτεύων κλάδος της πλειότιμης

$$\begin{aligned} \log(1+i) &= \log(\sqrt{2}e^{i(\pi/4+2k\pi)}) \\ &= \log(\sqrt{2}) + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \\ &= \frac{1}{2}\ln(2) + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \end{aligned}$$

**Από σήμερα:**  $\operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$

Πριν 7 ημέρες:  $e^z = e^{x+iy} = e^x \cos y + i \sin y$

Σήμερα:  $\exp(z) \stackrel{\text{op}}{=} 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$

### Θεώρημα

Η  $\exp(z)$  είναι παραγωγίσιμη σε κάθε  $z \in \mathbb{C}$  και ικανοποιεί:

$$(1) \quad \forall z : (\exp(z))' = \exp(z)$$

$$(2) \quad \forall z_1, z_2 : \exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \exp(z_2)$$

$$(3) \quad \forall \theta \in \mathbb{R} : \exp(i\theta) = \cos \theta + i \sin \theta$$

**Απόδ.**

(1)

$$\begin{aligned} (\exp(z))' &= \left(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots\right)' \\ &= 0 + 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots = \exp(z) \end{aligned}$$



$$(2) g(z) = \exp(z) \exp(\zeta - z)$$

$$\frac{dg}{dz} = \exp(z) \exp(\zeta - z) + \exp(z) \exp(\zeta - z)(-1) = 0$$

$$\Rightarrow g(z) = c \Rightarrow c = g(0) = \exp(\zeta)$$

$$\Rightarrow \exp(\zeta) = g(z) = \exp(z) \exp(\zeta - z)$$

**Θέτω:**  $z = z_1, \zeta = z_1 + z_2$

**Οπότε:**

$$\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \cdot \exp(z_2)$$

(3)

$$\begin{aligned} \exp(i\theta) &= 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right) + i \cdot \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta. \end{aligned}$$

$\exp(z) = e^z$

$$\exp(1+i) = 1 + (1+i) + \frac{(1+i)^2}{2!} + \dots$$

$$e^{1+i} = 1 + (i+1) + \dots$$

ή ο αρ.  $e = 2.718$  υψωμένος στη μιγαδική δύναμη  $1+i$

### Θεώρημα

Η  $\exp(z)$  είναι περιοδική με περίοδο  $2\pi i$

**Απόδ.**

$$\exp(z + 2\pi i) = \exp(z) \exp(2\pi i) = \exp(z)$$

Η εικόνα του συνόλου  $A \subseteq \mathbb{C}$  υπό την συνάρτηση  $f(z)$  δηλ.

$$f(A) = \{w = f(z), z \in A\}$$

**Παρ.** Να δειχθεί ότι  $\exp(\mathbb{C}) = \mathbb{C} - \{0\}$

Διότι: έστω  $w = re^{i\phi} \in \mathbb{C} - \{0\}$ .

Θα βρω  $z = \rho e^{i\theta} = x + iy$  τ.ώ:  $\exp(z) = w$ .

$$\exp(z) = \exp(x + iy) = \exp(x) \exp(iy)$$

$$w = re^{i\phi}$$

$$\exp(x) = |\exp(z)| = |w| = r \Rightarrow \boxed{x = \ln(r)}$$

$$\text{Arg}(\exp(z)) = \text{Arg}(w)$$


$$\text{Arg}(\exp(z)) = \text{Arg}(\exp(x) \exp(iy)) = y$$

$$\text{Arg}(w) = \text{Arg}(re^{i\phi}) = \phi$$

$$\text{Arg}(\exp(z)) = \text{Arg}(w) \Rightarrow \boxed{y = \phi}$$

Τελικά  $z = x + iy = \ln(r) + i\phi$  ικανοποιεί  $\exp(z) = re^{i\phi} = w$ . Άρα  $\exp(\mathbb{C}) = \mathbb{C} - \{0\}$   
 Στην πραγματικότητα, δεν χρειαζόμαστε όλο το  $\mathbb{C}$  ως πεδίο ορισμού διότι:

$$\exp(U) = \mathbb{C} - \{0\}, \quad \text{όπου } U = \{x + iy : x \in \mathbb{R}, y \in (-\pi, \pi)\}$$




## 6.2 Λογαριθμική Συνάρτηση

$$w = \overset{\text{πλειότιμη}}{\log}(z) \iff z = \exp(w)$$

$$\begin{aligned} w &= \log(1 + i) \\ 1 + i &= \sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)} \\ \log(1 + i) &= \log\left(\sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)}\right) \\ &= \ln(\sqrt{2}) + \log\left(e^{i[\frac{\pi}{4} + 2k\pi]}\right) \\ &= \ln(\sqrt{2}) + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \quad k \in \mathbb{Z} \\ &= \left\{ \dots, \ln(\sqrt{2}) - i\frac{7\pi}{4}, \ln(\sqrt{2}) + i\frac{\pi}{4}, \ln(\sqrt{2}) + i\frac{3\pi}{4}, \ln(\sqrt{2}) - i\frac{17\pi}{4}, \dots \right\} \end{aligned}$$

$$\boxed{\log(z) = \ln(r) + i\arg(z)} \leftarrow \text{πλειότιμη}$$

$$\boxed{\text{Log}(z) = \ln(r) + i\text{Arg}(z)} \leftarrow \begin{array}{l} \text{μονότιμη} \\ \text{ασυνεχής για } x \in (-\infty, 0] \end{array}$$



### 6.3 Μιγαδικές δυνάμεις

$$z^c = e^{\log(z^c)} = e^{c \log z} = e^{c(\ln(|z|) + i \arg(z))}$$

ή

$$z^c = e^{\text{Log}(z^c)} = e^{c(\ln(|z|) + i \text{Arg}(z))}$$

$$\begin{aligned} \underbrace{(1+i)^{2-i}}_{\substack{z = 1+i \\ c = 2-i}} &= e^{(2-i) \log(1+i)} = e^{(2-i)(\ln(\sqrt{2}) + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi))} \\ &= e^{(2 \ln(\sqrt{2}) + (\frac{\pi}{4} + 2k\pi)) + i(-\ln(\sqrt{2}) + \frac{\pi}{2} + 4k\pi)} \\ &= e^{2 \ln(\sqrt{2}) + \frac{\pi}{4} + 2k\pi} \cdot e^{i(-\ln \sqrt{2} + \frac{\pi}{2} + 4k\pi)} \\ &= 2e^{\pi/4 + 2k\pi} \cdot \left[ \cos\left(-\ln(\sqrt{2}) + \frac{\pi}{2} + 4k\pi\right) + i \sin\left(-\ln(\sqrt{2}) + \frac{\pi}{2} + 4k\pi\right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{1+i} &= (1+i)^{1/2} = e^{1/2 \cdot \log(1+i)} \\ &= e^{1/2(\ln(\sqrt{2}) + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi))} \\ &= e^{1/2 \ln(\sqrt{2})} \cdot e^{i \frac{1}{2}(\pi/4 + 2k\pi)} \\ &= \sqrt[4]{2} e^{i(\frac{\pi}{8} + k\pi)} \\ &= \sqrt[4]{2} \left( \cos\left(\frac{\pi}{8} + k\pi\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{8} + k\pi\right) \right) \\ &= \begin{cases} \sqrt[4]{2} \left( \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \right) \\ \sqrt[4]{2} \left( \cos\left(\frac{9\pi}{8}\right) + i \sin\left(\frac{9\pi}{8}\right) \right) \end{cases} \end{aligned}$$

$$(-1)^i = e^{\log((-1)^i)} = e^{i \log(-1)} = e^{i(i(2k+1)\pi)} = e^{-(2k+1)\pi}$$

$$\begin{aligned} (1+i)^{\sqrt{2}} &= e^{\sqrt{2} \log(1+i)} = e^{\sqrt{2}(\ln(\sqrt{2}) + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi))} \\ &= \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \cdot e^{i\sqrt{2}(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)} \\ &= \sqrt{2}^{\sqrt{2}} (-1)^{\frac{\sqrt{2}}{4}} (-1)^{\sqrt{2}2k} \\ &= \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \sqrt{i}^{\sqrt{2}} (1)^{\sqrt{2}k} \\ &= \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \sqrt{i}^{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$(1+i)^{p/q} = \dots$$

$$m = \lambda q$$

**Παρ.** Να βρεθούν οι τιμές του  $n$  τ.ώ:

$$c_n = \sum_{k=0}^n i^k \in \mathbb{I}$$

$n$	
0	1
1	$1 + i$
2	$1 + i + i^2 = i$
3	$1 + i + i^2 + i^3 = 0$
4	1
5	$1 + i$
6	$i$
$\vdots$	$\vdots$


Άρα  $\forall_{n,m} : c_n = c_{n+4m}$

Οι φανταστικές τιμές του  $c_n$  προκύπτουν για

$$n = 2, 3,$$

$$6, 7,$$

$$10, 11,$$



**Απ.**  $n \in \{m + 4l : m \in \{2, 3\}, l \in \mathbb{N}_0\}$

**Παρ.** Να λυθεί η  $(1 + z)^{2n} = -(1 - z)^{2n} \quad n \in \mathbb{N}$

**Λύση** Φαίνεται άμεσα ότι  $z \neq 1$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1+z}{1-z}\right)^{2n} &= -1 \Rightarrow \\ \frac{1+z}{1-z} &= (-1)^{1/2n} = \left(e^{i(2k+1)\pi}\right)^{1/2n} \\ z &= \frac{e^{i(2k+1)\pi/2n} - 1}{e^{i(2k+1)\pi/2n} + 1} \\ &= \frac{\cos\left((2k+1)\frac{\pi}{2n}\right) + i\sin\left((2k+1)\frac{\pi}{2n}\right) - 1}{\cos\left((2k+1)\frac{\pi}{2n}\right) + i\sin\left((2k+1)\frac{\pi}{2n}\right) + 1} \\ &= \frac{-2\sin^2\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right) + i2\sin\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right)\cos\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right)}{2\cos^2\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right) + i2\sin\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right)\cos\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right)} \\ &\begin{cases} \cos\phi - 1 = -2\sin^2\frac{\phi}{2} \\ \cos\phi + 1 = 2\cos^2\frac{\phi}{2} \end{cases} \\ &= \frac{\sin\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right)\left[-\sin\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right) + i\cos\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right)\right]}{\cos\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right)\left[\cos\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right) + i\sin\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right)\right]} \\ z_k &= -i \tan\left((2k+1)\frac{\pi}{4n}\right) \quad k = 0, 1, \dots, 2n-1 \end{aligned}$$

## 6.4 Μετασχηματισμοί & Απεικονίσεις

### 6.4.1 Η γραμμική απεικόνιση


**Τύπος:**  $f(z) = az + b$ ,  $a, b \in \mathbb{C}$

Προφανώς η  $w = f(z) = az + b$  είναι 1-1 συνάρτηση και εύκολα βρίσκουμε την αντίστροφή της λύνοντας την  $w = az + b$  ως προς  $z$ .

Έτσι:  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} : f(z) = az + b$  και μπορώ να την επεκτείνω στο  $\bar{\mathbb{C}}$  με 1-1 τρόπο θέτοντας

$$f(\infty) = \infty$$

### Γεωμετρική ερμηνεία



- Προφανώς, από τη δομή της, η γραμμική απεικόνιση απεικονίζει ευθείες σε ευθείες και κύκλους σε κύκλους.

**Ερώτηση** Έστω  $f(z) = az + b$ .

Αν  $Ax + By + \Gamma = 0$  ευθεία τυχαία, βρείτε πού αυτή απεικονίζεται μέσω της  $f(z)$ .

$$w = u + iv = az + b$$

$$= u(x, y) + iv(x, y) = a(x + iy) + b$$

$$\bullet w = az + b \iff z = \frac{w-b}{a} \iff x + iy = \frac{u+iv-(b_0+ib_1)}{a_0+ia_1} = \frac{[(u-b_0)+i(v-b_1)][a_0-a_1i]}{|a|^2} =$$

$$\frac{(u-b_0)a_0+a_1(v-b_1)}{|a|^2} + i \frac{-a_1(u-b_0)+a_0(v-b_1)}{|a|^2}$$

Άρα:

$$x = \frac{a_0u + a_1v - (a_0b_0 + a_1b_1)}{|a|^2}$$

$$y = \frac{-a_1u + a_0v + (a_1b_0 - a_0b_1)}{|a|^2}$$

$$Ax + By + \Gamma = 0$$

$$\Leftrightarrow A(a_0u + a_1v - (a_0b_0 + a_1b_1)) + B(-a_1u + a_0v + (a_1b_0 - a_0b_1)) + \Gamma|a|^2 = 0$$

#### 6.4.2 Αντιστροφή $f(z) = \frac{1}{z}$ ( $z \neq 0$ )

Προφανώς:  $\mathbb{C} - \{0\} \rightarrow \mathbb{C} : f(z) = \frac{1}{z}$   
 και μπορεί να επεκταθεί στο  $\bar{\mathbb{C}}$  θέτοντας  $f(0) = \infty$  και  $f(\infty) = 0$ .

Εννοείται ότι είναι 1-1 με  $w = \frac{1}{z} \Leftrightarrow z = \frac{1}{w}$  δηλ. για  $\begin{cases} w = u + iv \\ z = x + iy \end{cases}$  έχουμε:

$$x + iy = \frac{u - iv}{u^2 + v^2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{u}{u^2 + v^2} \\ y = \frac{-v}{u^2 + v^2} \end{cases} \quad (2)$$

Έτσι φαίνεται ότι η συνάρτηση αυτή απεικονίζει ευθείες σε ευθείες ή κύκλους, και κύκλους σε ευθείες ή κύκλους.

Πράγματι, αν  $Ax + By + \Gamma = 0$  τυχαία ευθεία στο επίπεδο του  $z$ , τότε από (2):

$$A \frac{u}{u^2 + v^2} - B \frac{v}{u^2 + v^2} + \Gamma = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{Au - Bv + \Gamma(u^2 + v^2) = 0}$$

- $\Gamma = 0$  τότε  $Au - Bv = 0$  άρα ευθεία απεικον. σε ευθεία, ενώ:
- $\Gamma \neq 0$  τότε  $u^2 + v^2 + \frac{A}{\Gamma}u - \frac{B}{\Gamma}v = 0$  **δηλ.** κύκλος

$$x^2 + y^2 + Ax + By + \Gamma = 0$$

$Hf(z) = \frac{1}{z}$  απεικονίζει το εσωτερικό μοναδιαίου κύκλου  $|z| = 1$  με κέντρο το  $z = 0$ , στο εξωτερικό του (με 1-1 τρόπο, και αντιστρόφως).

**Πράγματι:**

$$z : |z| < 1, \text{ τότε } f(z) = \frac{1}{z} \text{ με } |f(z)| = \frac{1}{|z|} > 1 \Rightarrow |f(z)| > 1$$

$$z : |z| > 1, \text{ τότε } f(z) = \frac{1}{z} \text{ με } |f(z)| = \frac{1}{|z|} < 1 \Rightarrow |f(z)| < 1$$

$$z : |z| = 1, \text{ τότε } f(z) = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \bar{z}$$

#### 6.4.3 Μετασχ. Möbius

Καλούμε ρητογραμμικό μετασχηματισμό (Möbius) κάθε συνάρτηση

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d} \quad (\text{με } ad - bc \neq 0)$$


Προφανώς:  $f : \mathbb{C} - \{-d/c\} \rightarrow \mathbb{C} - \{\frac{a}{c}\}$ , αν  $c \neq 0$

ή  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  αν  $c = 0$

$Hf$  είναι 1-1 (εύκολο).

- Αποδεικνύεται ότι ο μετασχ. Möbius είναι σύνθεση διαστολής, περιστροφής, μετάθεσης και αντιστροφής, άρα απεικονίζει ευθείες σε ευθείες ή κύκλους, και κύκλους σε ευθείες ή κύκλους.
- Ο μετασχ. Möbius (στην περίπτωση ευθείας ή κύκλου) απεικονίζει συμπληρωματικούς τόπους σε συμπληρωματικούς τόπους.

π.χ.



- Αποδεικνύεται ότι υπάρχει ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ μετασχ. Möbius που απεικονίζει ΤΡΙΑ σημεία  $z_1, z_2, z_3$  σε ΤΡΙΑ ΑΛΛΑ σημεία  $w_1 = f(z_1), w_2 = f(z_2), w_3 = f(z_3)$ , και έχει τη μορφή:

$$\frac{(w - w_1)(w_2 - w_3)}{(w - w_3)(w_2 - w_1)} = \frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)}$$


## 6.5 Τριγωνομετρικές και αντίστροφές τους

- Η συνάρτηση

$$\sin : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} : \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

είναι  $2\pi$ -περιοδική, άρα μη αντιστρέψιμη στο  $\mathbb{C}$

Έστω  $E_k = \{x + iy : \kappa\pi - \frac{\pi}{2} < x < \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, y \in \mathbb{R}\}, k \in \mathbb{Z}$  είναι "κατακόρυφες λωρίδες". Για  $k = 0$ , έχω:



Τότε η  $\sin z$  γίνεται 1-1 με πεδίο τιμών το σύνολο

$$A = \mathbb{C} - \{u + iv : |u| \geq 1 \text{ και } v = 0\}$$

Έτσι η  $\sin : E_k \rightarrow A$  είναι 1-1 (για κάθε συγκεκριμένο  $k \in \mathbb{Z}$ ), άρα αντιστρέψιμη.

- Από  $w = \sin z$  παίρνω:

$$\begin{cases} u(x, y) = \sin x \cosh y \\ v(x, y) = \cos x \sinh y \end{cases}$$



- Για  $x = \frac{\pi}{2}$ ,  $y \in \mathbb{R} \xrightarrow[\text{απεικονίζεται}]{\sin z} (\cosh y, 0)$

Αλλά  $\cosh y$  δεν είναι 1-1  $\forall y$ , επομένως η  $\sin z$  ΔΕΝ μπορεί να είναι 1-1 πάνω στην  $x = \frac{\pi}{2}$ , η οποία εξαιρείται από το πεδίο ορισμού. Έτσι, από το πεδίο τιμών, εξαιρείται η ημιευθεία

$$\{u + iv : u \geq 1, v = 0\}$$

- Για  $x = -\frac{\pi}{2}$ , ομοίως εξαιρείται η ημιευθεία

$$\{u + iv : u \leq -1, v = 0\}$$

- Για  $x = 0$ ,  $y \in \mathbb{R} \xrightarrow[\text{απεικον.}]{\sin z} (0, \sinh y)$  και επειδή  $\sinh y$  1-1 γν. αύξ. με πεδίο τιμών το  $\mathbb{R} \forall y$  η  $x = 0$  απεικον. στην  $u = 0$ .

- Έστω  $x = a$  ( $a \neq \pm \frac{\pi}{2}$ ),  $a \neq 0$ .

**Τότε:** 
$$\begin{cases} u = \sin a \cosh y \\ v = \cos a \sinh y \end{cases} \Rightarrow \frac{u^2}{\sin^2 a} - \frac{v^2}{\cos^2 a} = 1. \text{ Αν } a \in (0, \frac{\pi}{2}), \text{ τότε } \begin{cases} u > 0 \\ v \in \mathbb{R} \end{cases}, \text{ και}$$

αντίστοιχα για  $a \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ .

Έτσι ορίζουμε:

$$\text{τοξημ} = \arcsin : E' \rightarrow E_k :$$

$$\arcsin z = w \Leftrightarrow z = \sin w = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{i2}$$

$$\Leftrightarrow e^{2iw} - 2ize^{iw} - 1 = 0 \Leftrightarrow e^{iw} = \frac{2iz + \sqrt{4 - 4z^2}}{2}$$

$$\Rightarrow iw = \log \left( iz + \sqrt{1 - z^2} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\arcsin z = -i \log \left( iz + \sqrt{1 - z^2} \right)}$$

## Κεφάλαιο 7 Ακολουθίες & Σειρές (Μιγαδικών αριθμών/συναρτήσεων)

### Ορισμός

Ακολουθία  $(u_n(z))_{n=1}^{\infty}$

### Ορισμός

Λέμε ότι η  $u_n(z)$  τείνει σε  $u(z)$ .

Γράφουμε  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z) = u(z)$

$$\forall z, \forall \epsilon > 0 \exists N_{\epsilon, z} : n \geq N_{\epsilon, z} \Rightarrow |u_n(z) - u(z)| < \epsilon$$

Παρ.  $u_n(z) = 1 + \frac{z}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} = 1 \text{ διότι}$$

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{C}, \forall \epsilon > 0 : n \geq \frac{|z|}{\epsilon} + 1 &\Rightarrow \left| 1 + \frac{z}{n} - 1 \right| < \epsilon \\ &\Leftrightarrow \left| \frac{z}{n} \right| < \epsilon \\ &\Leftrightarrow n > \frac{|z|}{\epsilon} \end{aligned}$$

### Ορισμός

Έστω ακολουθία  $(u_n(z))_{n=1}^{\infty}$

$$S_1(z) = u_1(z)$$

Ορίζω νέα ακολουθία  $(S_1(z))_{n=1}^{\infty}$  ως εξής:

$$S_2(z) = u_1(z) + u_2(z)$$

...

$$S_n(z) = u_1(z) + u_2(z) + \dots + u_n(z)$$

Εάν  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) = S(z)$  γράφω  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z) = S(z)$  και το ονομάζω **σειρά**.

**Παρ.** για  $n \in \mathbb{N}$  ορίζω  $u_n(z) = z^n \cdot (1 - z)$ . Τότε

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(z) &= \sum_{n=1}^{\infty} z^n (1 - z) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (z^n - z^{n+1}) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} (z - z^2 + z^2 - z^3 + z^3 - z^4 + \dots - z^{N+1}) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} (z - z^{N+1}) = z - \lim_{N \rightarrow \infty} z^{N+1} \\ &\stackrel{\text{Θέτω } z = re^{i\theta}}{=} z - \lim_{N \rightarrow \infty} r^N e^{iN\theta} \\ &= z \text{ όταν } |z| < 1 \end{aligned}$$

Τελικά

$$\sum_{n=1}^{\infty} z^n \cdot (1 - z) = \begin{cases} z & \text{όταν } |z| < 1 \\ \text{δεν ορίζεται} & \text{όταν } |z| \geq 1 \end{cases}$$

(Για  $z = 0$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} = 0^n(1 - z) = 0 = z$ )

Ισχύει  $|z| < 1 \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} z^N = 0$ , διότι

$$\begin{aligned} \forall z \text{ με } |z| < 1, \epsilon > 0 \quad n \geq \frac{\ln \epsilon}{\ln |z|} + 1 &\Rightarrow |z^n| < \epsilon \\ &\Leftrightarrow |z|^n < \epsilon \\ &\Leftrightarrow n \cdot \ln |z| < \ln \epsilon \\ &\Leftrightarrow n < \frac{\ln \epsilon}{\ln |z|} \end{aligned}$$

### Ορισμός

Λέω ότι η  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$  **συγκλίνει απολύτως** αν  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(z)|$  συγκλίνει.

### Ορισμός

Λέμε ότι η  $(u_n(z))_{n=1}^{\infty}$  **συγκλίνει ομοιόμορφα** στην  $u(z)$  ανν

$$\forall z, \forall \epsilon > 0 \exists \underbrace{N}_{N_\epsilon} : n \geq N_\epsilon \implies |u_n(z) - u(z)| < \epsilon$$

Το  $N_\epsilon$  δεν εξαρτάται από το  $z$

Παρόμοια πράγματα λέμε και για την  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$

**Παρ.** Η  $\sum_{n=1}^{\infty} z^n \cdot (1-z)$  συγκλίνει ομοιόμορφα για κάθε  $z$  με  $|z| \leq \frac{1}{2}$

**Διότι**

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N z^n (1-z) = z - \lim_{N \rightarrow \infty} z^{N+1}$$

→ Αρκεί να δείξω ότι  $z^{N+1} \rightarrow 0$  ομοιόμορφα.

$$\forall z, |z| \leq \frac{1}{2}, \forall \epsilon > 0, \forall n \geq \frac{\ln \epsilon}{\ln |z|} + 1 \implies |z^{N+1}| < \epsilon$$

Ισχυρίζομαι ότι

$$\forall z, |z| \leq \frac{1}{2}, \forall \epsilon > 0, \forall n \geq \frac{\ln \epsilon}{\ln \frac{1}{2}} + 1 \implies |z^{N+1}| < \epsilon$$

$$\text{διότι } |z| \leq \frac{1}{2} \implies \frac{\ln \epsilon}{\ln \frac{1}{2}} \geq \frac{\ln \epsilon}{\ln |z|}$$

### Θεώρημα

Έστω  $(u_n(z))_{n=1}^{\infty}$  ακολουθία συνεχών συναρτήσεων και  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z) = u(z)$  ομοιόμορφα στο χωρίο  $\Delta$ .

$$\text{Τότε } \int_c u(z) dz = \int_c \sum_{n=1}^{\infty} u_n(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int_c u_n(z) dz$$

### Θεώρημα

Θέτω  $(u_n(z))_{n=1}^{\infty}$  ακολουθία αναλυτικών (ολόμορφων) συναρτήσεων και  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z) = u(z)$  συγκλίνει ομοιόμορφα στο χωρίο  $D$ . Τότε

$$\frac{du}{dz} = \frac{d}{dz} \left( \sum_{n=1}^{\infty} u_n(z) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{du_n}{dz}$$

### Θεώρημα

Αν συγκλίνει η  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(z)|$ , τότε συγκλίνει και η  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$

Το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα.

### Θεώρημα

Αν συγκλίνει η  $\sum_{n=1}^{\infty} |v_n(z)|$  και  $\forall n, z : |u_n(z)| \leq |v_n(z)|$ , τότε συγκλίνει και η  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(z)|$

### Θεώρημα: Κριτήριο του λόγου

Έστω  $L(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(z)}{u_n(z)} \right|$ . Τότε

$L(z) < 1$  η  $\sum_{n=1}^{\infty}$  συγκλίνει

$L(z) > 1$  η  $\sum_{n=1}^{\infty}$  δεν συγκλίνει

$L(z) = 1$  δεν μπορούμε να αποφανθούμε

### Θεώρημα: Κριτήριο της ρίζας

Έστω  $L(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(z)|}$ . Τότε

$L(z) < 1$  η  $\sum_{n=1}^{\infty}$  συγκλίνει

$L(z) > 1$  η  $\sum_{n=1}^{\infty}$  δεν συγκλίνει

$L(z) = 1$  δεν μπορούμε να αποφανθούμε

**Παρ.** Η  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n \cdot (n+1)}$  συγκλίνει όταν  $|z| \leq 1$ , δεν συγκλίνει όταν  $|z| > 1$

$$\text{Θέτω } L(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z^{n+1}/(n+1)(n+2)}{z^n/n(n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |z| \frac{n}{n+2} = |z|$$

Όταν  $|z| = 1$ , τότε

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n(n+1)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

Αφού συγκλίνει απολύτως, συγκλίνει (για κάθε  $z : |z| = 1$ )

**Παρ.**  $\sum_{n=1}^{\infty} z^n$  συγκλίνει όταν  $|z| < 1$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N z^n &= z + z^2 + z^3 + \dots + z^N \\ &= z \cdot (1 + z + z^2 + \dots + z^{N-1}) \\ &= z \cdot \frac{1 - z^N}{1 - z} = \frac{z}{1 - z} (1 - z^N) \\ &= \frac{z}{1 - z} \text{ για } N \rightarrow \infty \text{ όταν } |z| < 1 \end{aligned}$$

Για  $|z| > 1$  δεν συγκλίνει.

Για  $|z| = 1$  δεν συγκλίνει (τουλάχιστον για κάποιες τιμές).

Εναλλακτικά, με κριτήριο ρίζας:  $L(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z^n|} = |z|$

και κριτήριο λόγου:  $L(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z^{n+1}}{z^n} \right| = |z|$

Παρ.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+2)^n}{(n+1)^3 4^n}$

$$L(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(z+2)^{n+1}}{(n+2)^3 4^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|z+2|}{4} \left( \frac{n+1}{n+2} \right)^3 = \frac{|z+2|}{4} \rightarrow \begin{cases} |z+2| < 4 & \text{συγκλίνει} \\ |z+2| = 4 & * \\ |z+2| > 4 & \text{δεν συγκλίνει} \end{cases}$$

Αν  $|z+2| = 4$ , ελέγχουμε αν συγκλίνει απολύτως:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(z+2)^n}{(n+1)^3 4^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{(n+1)4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} < \infty$$

Παρ.  $\sum_{n=1}^{\infty} n! z^n$

$$L(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |z|^{n+1}}{n! |z|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |z| = \begin{cases} \infty & |z| \neq 0 \\ 0 & |z| = 0 \end{cases}$$

- $\sum \frac{z^n}{n(n+1)}$  συγκλίνει για  $|z| \leq 1$
- $\sum z^n$  συγκλίνει για  $|z| \leq 1$
- $\sum \frac{(z+2)^n}{(n+1)^3 4^n}$  συγκλίνει για  $|z+2| \leq 4$
- $\sum n! z^n$  συγκλίνει για  $|z| = 0$

## 7.1 Δυναμοσειρές & Σειρές Laurent

### Ορισμός

Δυναμοσειρά:  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$

### Θεώρημα

Για κάθε δυναμοσειρά  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$  υπάρχει  $R \geq 0$ , τ.ώ:

$|z - z_0| < R$  η δυναμοσειρά συγκλίνει ομοιόμορφα  
 $|z - z_0| > R$  η δυναμοσειρά δεν συγκλίνει

Στο  $|z - z_0| = R$  η ΔΣ μπορεί να συγκλίνει σε κάποια σημεία και να μην συγκλίνει σε άλλα. Αυτό παρατηρούμε και στα 4 παραπάνω παραδείγματα.

Όταν  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \rightarrow$  σειρά Taylor.

Όταν  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \rightarrow$  σειρά Laurent.

Η σειρά Laurent περιλαμβάνει την Taylor ως ειδική περίπτωση.

Αν είναι "γνήσια" σειρά Laurent ( $a_n \neq 0$  για κάποια αρνητικά  $n$ ), τότε το  $z_0$  λέγεται ανώμαλο σημείο της σειράς Laurent.

### Θεώρημα

Για κάθε  $\Delta \Sigma f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$  υπάρχει αριθμός  $R \geq 0$  (ακτίνα σύγκλισης) τ.ώ

(α) Η  $\Delta \Sigma$  συγκλίνει ομοιόμορφα και απόλυτα στο  $\underset{\text{δίσκος σύγκλισης}}{D_R}(z_0) = \{z : |z - z_0| < R\}$

(β) Η  $\Delta \Sigma$  αποκλίνει στο  $\{z : |z - z_0| > R\}$

(γ) Σε κάθε σημείο του συνόρου του δίσκου σύγκλισης  $\{z : |z - z_0| = R\}$  η  $\Delta \Sigma$  μπορεί να συγκλίνει ή να αποκλίνει

### Θεώρημα

Για κάθε  $\Delta \Sigma f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ ,  $\forall z \in D_R(z_0)$  ισχύουν:

(α)

$$\frac{df}{dz} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot a_n \cdot (z - z_0)^{n-1}$$

(β) Για κάθε  $C \subseteq D_R(z_0)$


$$\int_C f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_C (z - z_0)^n dz$$

### Θεώρημα

Έστω  $f(z)$  αναλυτική στο εσωτερικό κλειστής καμπύλης  $C$ . Έστω  $z_0, z$  σημεία στο εσωτερικό της  $C$ . Τότε

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \left( \oint_{C'} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n-1}} dz \right) (z - z_0)^n$$



**ΠΑΡ.** Να βρεθεί η σειρά Taylor της  $f(z) = \sin z$ , γύρω από το  $z_0 = 0$ .

**ΛΥΣΗ**

$$\begin{aligned} f(z) &= \sin(z) & f(0) &= 0 \\ f'(z) &= \cos(z) & f'(0) &= 1 \\ f''(z) &= -\sin(z) & f''(0) &= 0 \\ f'''(z) &= -\cos(z) & f'''(0) &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(z) &= 0(z - z_0^0)^0 + \frac{1}{1!}(z - z_0^0)^1 + \frac{0}{2!}(z - z_0^0)^2 + \frac{1}{3!}(z - z_0^0)^3 + \dots \\ \sin(z) &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots \end{aligned}$$

**ΠΑΡ.** Να βρεθεί η σειρά Taylor του  $\sin z$  γύρω από το  $z_0 = \pi/3$

**Α' τρόπος**

$$\begin{aligned} f(\pi/3) &= \sqrt{3}/2 & , f''(\pi/3) &= -\sqrt{3}/2 \\ f'(\pi/3) &= 1/2 & , f'''(\pi/3) &= -1/2, \dots \end{aligned}$$

$$\sin(z) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}(z - \pi/3) - \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 2!}(z - \pi/3)^2 - \frac{1}{2 \cdot 3!}(z - \pi/3)^3$$

**Β' τρόπος**  $u = z - \pi/3 \Rightarrow z = u + \pi/3$

$$\begin{aligned} \sin(z) &= \sin(u + \pi/3) = \sin(u) \overset{1/2}{\cancel{\cos \frac{\pi}{3}}} + \cos(u) \overset{\sqrt{3}/2}{\cancel{\sin \frac{\pi}{3}}} \\ &= \frac{1}{2} \left( u - \frac{u^3}{3!} + \frac{u^5}{5!} - \dots \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left( 1 - \frac{u^2}{2!} + \frac{u^4}{4!} - \dots \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}u - \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 2!}u^2 - \frac{1}{2 \cdot 3!}u^3 + \dots \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left( z - \frac{\pi}{3} \right) - \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 2!} \left( z - \frac{\pi}{3} \right)^2 - \dots \end{aligned}$$

**ΠΑΡ.** Να βρεθεί η σειρά Taylor της  $f(z) = \frac{1}{1-z}$  γύρω από το  $z_0 = 2$

**ΛΥΣΗ**

$$z - 2 = u$$

$$z - 1 = u + 1$$


$$1 - z = -(1 + u)$$

$$\forall u : |u| < 1 : \frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + \dots$$

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{1+u} = -1 + u - u^2 + u^3 - \dots$$

$$|z - 2| < 1 : \frac{1}{1-z} = -1 + (z - 2) - (z - 2)^2 + (z - 2)^3$$

(για  $z = 3, f(z) = -1 + 1 - 1 + 1 - \dots$ )



**ΠΑΡ.** Να βρεθεί η σειρά Taylor της  $f(z) = \frac{z}{z^2 - 2z - 3}$  γύρω από το  $z_0 = 0$

$$\begin{aligned} \frac{z}{z^2 - 2z - 3} &= \frac{A}{z-3} + \frac{B}{z-1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{z+1} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{z-3} \\ &= \frac{1}{4} \cdot (1 - z + z^2 - z^3 + \dots) - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{3}} \\ &= \frac{1}{4} \cdot (1 - z + z^2 - z^3 + \dots) - \frac{1}{4} \left( 1 + \frac{z}{3} + \frac{z^2}{9} + \dots \right) \\ &= -\frac{1}{3}z + \frac{8}{36}z^2 + \dots \end{aligned}$$

$$|z| < 1 \quad \left| \frac{z}{3} \right| < 1 \Rightarrow |z| < 3$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2 - 2z - 3} &= \frac{1}{(z-1)^2 - 4} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{z-1}{2}\right)^2} \\ &= -\frac{1}{4} \cdot \left( 1 + \left(\frac{z-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{z-1}{2}\right)^4 + \left(\frac{z-1}{2}\right)^6 + \dots \right) \end{aligned}$$

$$|z-1| < 2 : \frac{1}{z^2 - 2z - 3} = -\frac{1}{4} - \frac{\left(\frac{z-1}{2}\right)^2}{4} - \frac{\left(\frac{z-1}{2}\right)^4}{4} - \dots$$




## Θεώρημα

Έστω  $R_2 < R_1$ ,  $C_1 = \{z : |z - z_0| = R_1\}$   
 $C_2 = \{z : |z - z_0| = R_2\}$

$A_{R_2, R_1}(z_0) = \{z : R_1 < |z - z_0| < R_2\}$  δακτύλιος χωρίς σύνορο

$\bar{A}_{R_2, R_1}(z_0) = \{z : R_1 \leq |z - z_0| \leq R_2\}$  δακτύλιος με σύνορο



Έστω  $f(z)$  αναλυτική στο  $\bar{A}_{R_2, R_1}(z_0)$ . Τότε  $\forall z \in A_{R_1, R_2}(z_0)$  ισχύει

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

Αυτή λέγεται σειρά Laurent (Λοράντ) της  $f(z)$  γύρω από το  $z_0$ .

$$\forall n \in \mathbb{Z} : a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

(η  $C$  εντός του  $A_{R_2, R_1}(z_0)$ )


**ΠΑΡ.** Βρείτε την σειρά Laurent της  $f(z) = \frac{\sin z}{z^2}$  γύρω από το  $z_0 = 0$ .

**Λύση**

$$\begin{aligned} \frac{\sin z}{z^2} &= \frac{1}{z^2} \cdot \sin z \\ &= \frac{1}{z^2} \left( z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots \right) \end{aligned}$$

$$\forall z : 0 < |z| < \infty : \frac{\sin z}{z^2} = \frac{1}{z} - \frac{z}{3!} + \frac{z}{5!} - \dots$$

Το  $z_0 = 0$  είναι **πόλος** πρώτης τάξης.



**ΠΑΡ**  $\frac{\sin z}{z}$

$$0 < |z| < \infty : \frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots$$

Το  $z_0 = 0$  είναι απαλείψιμο ανώμαλο σημείο.

**ΠΑΡ** Να βρεθεί η σειρά Laurent της  $f(z) = \frac{e^{2z}}{(z+1)^2}$  γύρω από το  $z_0 = -1$

**Λύση**

$$\begin{aligned} \frac{e^{2z}}{(z+1)^2} &= \frac{e^{-2}}{(z+1)^2} \cdot e^{2(z+1)} \\ &= e^{-2} \cdot \frac{1}{(z+1)^2} \cdot \left( 1 + 2(z+1) + \frac{4 \cdot (z+1)^2}{2!} + \frac{8 \cdot (z+1)^3}{3!} + \dots \right) \end{aligned}$$

$$0 < |z+1| < \infty : \frac{e^{2z}}{(z+1)^2} = \frac{e^{-2}}{(z+1)^2} + \frac{2e^{-2}}{z+1} + 2e^{-2} + \frac{4e^{-2}}{3} \cdot (z+1) + \dots$$

Παρατηρώ ότι  $z_0 = -1$  είναι πόλος 2<sup>ης</sup> τάξης

$$\oint \frac{e^{2z}}{(z+1)^2} dz = \oint \frac{e^{-2}}{(z+1)^2} dz + \oint \frac{2e^{-2}}{z+1} dz + \oint \frac{4e^{-2}}{3} (z+1) dz + \dots$$

$$\oint \frac{e^{2z}}{(z+1)^2} dz = 2e^{-2}2\pi i$$

### Ορισμός

Έστω  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ .

Έστω  $n_1$  ο ελάχιστος  $n$  τ.ώ.  $a_n \neq 0$ .

(αν δεν υπάρχει το ελάχιστο, θέτω  $n_1 = -\infty$ )

α. Αν  $-n_1 = 0$ , τότε το  $z_0$  είναι απαλείψιμο ανώμαλο σημείο (πόλος μηδενικής τάξης)

β. Αν  $\infty > n_1 > 0$ , τότε το  $z_0$  είναι πόλος τάξης  $-n_1$

γ. Αν  $n_1 = -\infty$ , τότε το  $z_0$  είναι ουσιώδες ανώμαλο σημείο (πόλος  $\infty$  τάξης)

Η  $f(z) = e^{1/z}$  έχει το  $z_0 = 0$  πόλο άπειρης τάξης.

## 7.2 Δέκα Σειρές Laurent

1.  $f(z) = (z-2) \sin(z-1)$  γύρω από το  $z_0 = 1$

**Λύση**

$$\begin{aligned} f(z) &= (z-1) \sin(z-1) - \sin(z-1) \\ &= (z-1)^2 - \frac{(z-1)^4}{3!} + \frac{(z-1)^6}{5!} - \dots - \left( z-1 - \frac{(z-1)^3}{3!} + \frac{(z-1)^5}{5!} - \dots \right) \\ &= -(z-1) + (z-1)^2 + \frac{(z-1)^3}{3!} - \frac{(z-1)^4}{3!} + \dots \end{aligned}$$

Ισχύει  $\forall z \in \mathbb{C}$

$$2. f(z) = \frac{z}{z^2+3z+2}, \quad z_0 = -2$$


**Λύση**

$$f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)} = -\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z+2}$$

$$g_2(z) = \frac{1}{z+2}$$

$$g_1(z) = -\frac{1}{z+1} = -\frac{1}{z+2-1} = \frac{1}{1-(z+2)} = 1 + (z+2) + (z+2)^2 + \dots \quad 0 < |z+2| < 1$$

$$\begin{aligned} f(z) &= g_2(z) + g_1(z) \\ &= \frac{2}{z+2} + 1 + (z+2) + (z+2)^2 + \dots \end{aligned}$$



Σε δυνάμεις της  $(z+2)$  αλλά μακριά από το  $z_0 = -2$  (δηλ.  $|z+2| > 1$ )

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{2}{z+2} + \frac{1}{1-(z+2)} \\ \frac{1}{1-(z+2)} &= -\frac{1}{z+2} \cdot \frac{1}{-\frac{1}{z+2} + 1} \\ &= -\frac{1}{z+2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{z+2}} = -\frac{1}{z+2} \left( 1 + \frac{1}{z+2} + \frac{1}{(z+2)^2} + \dots \right) \\ f(z) &= \frac{1}{z+2} - \frac{1}{(z+2)^2} - \frac{1}{(z+2)^3} - \dots \end{aligned}$$

Το  $z_0 = -2$  είναι πόλος 1<sup>ης</sup> τάξης.

3. Η ίδια σειρά, γύρω και κοντά στο  $z_0 = -1$


$$f(z) = -\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z+2}$$

$$g_2(z) = \frac{2}{z+2} = \frac{2}{1+(z+1)} = 2 \cdot (1 - (z+1) + (z+1)^2 - (z+1)^3 + \dots)$$

$$f(z) = -\frac{1}{z+1} + 2 - 2 \cdot (z-1) + 2(z+1)^2 - 2(z+1)^3 + \dots$$

$$\boxed{-\frac{1}{z+1} + 2 - 2 \cdot (z-1) + 2(z+1)^2 - 2(z+1)^3 + \dots = \frac{z}{z^2+3z+2}} \quad \boxed{0 < |z+1| < 1}$$

$$\boxed{\frac{2}{z+2} + 1 + (z+2) + (z+2)^2 + \dots = \frac{z}{z^2+3z+2}} \quad \boxed{0 < |z+2| < 1}$$



Θα επιβεβαιώσω ότι οι δύο αυτές σειρές είναι ίσες μεταξύ τους και με την τιμή της συνάρτησης.

$$f(-3/2) = \frac{-3/2}{9/4 - 3/2 + 3/4} = 6$$

$$f_1(-3/2) = 2 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = 6$$

$$f_2(-3/2) = 4 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = 6$$

4.  $f(z) = \frac{1}{z^2 \cdot (z-1)^2}$  γύρω από το  $z_0 = 0$

**Λύση**

$$f_1(z) = \frac{1}{z^2}$$

$$f_2(z) = \frac{1}{(z-1)^2}$$

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots$$

$$\frac{1}{(z-1)^2} = \left(\frac{-1}{z-1}\right)' = \left(\frac{1}{1-z}\right)' = (1 + z + z^2 + z^3 + \dots)' = 0 + 1 + 2z + 3z^2 + \dots$$

$$f_2(z) = 1 + 2z + 3z^2 + \dots$$

$$f(z) = f_1 f_2 = \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z} + 3 + 4z + 5z^2 + \dots$$

5.  $f(z) = \frac{1}{z^2 \cdot (z-1)^2}$ ,  $z_0 = 1$

$$f_2(z) = \frac{1}{(z-1)^2}$$

$$f_1(z) = \frac{1}{z^2} = \frac{1}{(1+(z-1))^2}$$

$$\frac{1}{(1+u)^2} = 1 - 2u + 3u^2 - \dots$$

$$\frac{1}{z^2} = 1 - 2(z-1) + 3(z-1)^2 + \dots$$

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} - \frac{2}{(z-1)} + 3 - 4(z-1) + \dots$$

$$\frac{1}{(1+u)^2} = \frac{1}{1+2u+u^2}$$

$$\begin{array}{l|l} 1 & 1 + 2u + u^3 + \dots \\ \hline 1 + 2u + u^2 & 1 - 2u + 3u^2 + \dots \\ -2u - u^2 & \\ -2u - 4u^2 - 2u^3 & \\ 3u^2 + 2u^3 & \end{array}$$

Ομοίως, τη σειρά της  $\frac{1}{z^2+3z+2}$  γύρω από το  $z_0 = -1$  μπορώ να την βρω αντικαθιστώντας:

$$\frac{1}{z^2 + 3z + 2} = \frac{1}{(z+1)^2 + (z-1)} = \frac{1}{u^2 + u}$$

$$\begin{array}{l|l} 1 & u + u^2 \\ \hline 1 + u & \frac{1}{u} - 1 + \dots \\ -u & \end{array}$$

6.  $f(z) = \frac{1}{z \cdot (z-1)}$  γύρω από το  $z_0 = 0$

**Λύση**

$$\begin{aligned} f(z) &= -\frac{1}{z} \cdot (1 + z + z^2 + \dots) \\ &= -\frac{1}{z} - 1 - z - \dots \end{aligned}$$

για  $0 < |z| < 1$

7.  $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$  γύρω από το  $z_0 = 0$  για  $|z| > 1$

**Λύση**  $f(z) = f_1(z)f_2(z)$


$$f_1(z) = \frac{1}{z}$$

$$f_2(z) = \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \left( 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots \right)$$

$$f(z) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^4} + \dots$$

8.  $f(z) = \frac{2z+1}{z^2+z-2}$ , να βρεθούν όλες οι δυνατές σειρές Laurent γύρω από το  $z_0 = 0$ .

**Λύση** Τα ΑΣ (ανώμαλα σημεία) είναι  $z_1 = 1$  και  $z_2 = -2$ . Οπότε



**1η σειρά:**  $|z| < 1$

**2η σειρά:**  $1 < |z| < 2$

**3η σειρά:**  $2 < |z|$

$$f(z) = \frac{1}{\underbrace{z-1}_{f_1(z)}} + \frac{1}{\underbrace{z+2}_{f_2(z)}} = f_1(z) + f_2(z)$$

**1η σειρά**  $|z| < 1$

$$f_1(z) = -(1 + z + z^2 + \dots)$$

$$f_2(z) = \frac{1}{z+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \dots\right)}_{\left|\frac{z}{2}\right| < 1}$$

άρα για  $\forall z : |z| < 1$

$$f(z) = f_1(z) + f_2(z) = -\frac{1}{2} - \frac{5z}{4} - \frac{7z^2}{8} - \dots$$

**2η σειρά**  $1 < |z| < 2$  με  $u = 1/z$

$$\begin{aligned} f_1(z) &= \frac{1}{\frac{1}{u}-1} = \frac{u}{1-u} \\ &= u(1+u+u^2) + \dots \\ &= u+u^2+u^3 + \dots \end{aligned}$$

$$f_1(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \dots$$

$$f_2(z) = \frac{1}{2} - \frac{z}{4} + \frac{z^2}{8}$$

Τελικά:

$$f(z) = \dots - \frac{1}{z^2} - \frac{1}{2} - \frac{z}{4} + \frac{z^2}{8} + \dots$$

**3η σειρά**  $2 < |z|$

$$f_1(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \dots$$

$$\begin{aligned} f_2(z) &= \frac{1}{z+2} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+\frac{2}{z}} \\ &= \frac{1}{z} \cdot \left(1 - \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} - \dots\right) \end{aligned}$$

$$f_2(z) = \frac{1}{z} - \frac{2}{z^2} + \frac{4}{z^3} - \dots$$

$$f(z) = f_1 + f_2 = \frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{5}{z^3}$$

## Κεφάλαιο 8 Αρμονικές συναρτήσεις

### Θεώρημα

Αν η  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  είναι παραγωγίσιμη στο  $(x_0, y_0)$  τότε

$$\begin{aligned} u_x(x_0, y_0) &= v_y(x_0, y_0) \\ u_y(x_0, y_0) &= -v_x(x_0, y_0) \end{aligned} \quad \left( \begin{array}{l} \text{Cauchy-} \\ \text{Riemann} \end{array} \right)$$

**Παρ.**  $f(z) = z^3 = (x + iy)^3$   
 $= x^3 + 3x^2iy + 3xi^2y^2 + (iy)^3$   
 $= (x^3 - 3xy^2) + i \cdot (3x^2y - y^3)$

**Δηλ.**  $u = x^3 - 3xy^2$      $u_x = 3x^2 - 3y^2 = v_y$   
 $v = 3x^2y - y^3$      $u_y = -6xy = -v_x$

### Ορισμός

Λέμε την  $u(x, y)$  **αρμονική** στο χωρίο  $D$  αν  $\forall (x, y) \in D$ :

- (α) Οι  $u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}$  είναι συνεχείς
- (β) Ισχύει η εξίσωση του Laplace

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

### Θεώρημα

Αν η  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  είναι **αναλυτική** στο  $D$ , τότε οι  $u(x, y), v(x, y)$  είναι αρμονικές στο  $D$

**Απόδ.** Αφού η  $f(z)$  είναι αναλυτική ισχύουν

$$\left. \begin{aligned} u_x &= v_y \\ v_x &= -u_y \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} u_{xx} &= v_{yx} \\ v_{xy} &= -u_{yy} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$
$$u_{xx} = -u_{yy} \Rightarrow u_{xx} + u_{yy} = 0$$

Ομοίως δείχνεται  $v_{xx} + v_{yy} = 0$ .

**Παρ.**  $f(z) = z^3 = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3)$   
Θα δείξω ότι οι  $u, v$  αρμονικές

### Λύση

$$\begin{aligned} u_{xx} &= (u_x)_x = (3x^2 - 3y^2)_x = 6x \\ u_{yy} &= (u_y)_y = (-6xy)_y = -6x \\ u_{xx} + u_{yy} &= 6x - 6x = 0 \quad \text{άρα η } u \text{ αρμ.} \\ v_{xx} &= (v_x)_x = (6xy)_x = 6y \\ v_{yy} &= (v_y)_y = (3x^2 - 3y^2)_y = -6y \\ v_{xx} + v_{yy} &= 6y - 6y = 0 \quad \text{άρα η } v \text{ αρμ.} \end{aligned}$$

## Ορισμός

Αν η  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  είναι αναλυτική, λέμε ότι οι  $u, v$  είναι **συζυγείς αρμονικές**

**Παρ.** Να βρεθεί η συζυγής αρμονική της  $u = x^2 - y^2$

**Λύση** Από την εκφώνηση υποτίθεται ότι υπάρχει αναλυτική  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ , με  $u(x, y) = x^2 - y^2$ . Τότε:

$$u_x = 2x = v_y \Rightarrow v(x, y) = \int 2x \, dy = 2xy + c(x)$$

$$\Rightarrow v_x = 2y + \frac{dc}{dx} = -u_y = 2y \Rightarrow \frac{dc}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow c \text{ σταθ.}$$

**Τελικά**  $v(x, y) = 2xy + c$ ,  $f(z) = \underbrace{x^2 - y^2}_u + \underbrace{i2xy}_v + \tilde{c} = (x + iy)^2 + \tilde{c} = \boxed{z^2 + \tilde{c} = f(z)}$

**Παρ.** Να βρεθεί η συζυγής αρμονική της  $u = e^x \cos y$

**Λύση** Με το μάτι  $f(z) = e^z$ ,  $v(x, y) = e^x \sin y$


**Αλλιώς**  $u = e^x \cos y$ ,  $u_x = e^x \cos y = v_y \Rightarrow v = e^x \sin y + c \Rightarrow v_x = e^x \sin y + \frac{dc}{dx} = -u_y \Rightarrow \dots \Rightarrow v = e^x \sin y + c$

$$\begin{aligned} f(z) &= e^x \cos y + ie^x \sin y + \tilde{c} \\ &= e^x (\cos y + i \sin y) + \tilde{c} \\ &= e^x = e^x e^{iy} + \tilde{c} = e^z + \tilde{c} = f(z) \end{aligned}$$

## 8.1 Τι σημαίνει/σε τι χρησιμεύει/τι είναι η εξίσωση του Laplace;

Η λύση της Εξ. Laplace περιγράφει προβλήματα όπως

- (1) μετάδοση θερμότητας σε σταθερή κατάσταση
- (2) ροή ρευστών
- (3) πυκνότητα ηλ. φορτίου
- (4) δυναμικό μέσα σε έναν αγωγό




Η εξ. Laplace  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$  είναι διαφορική εξίσωση με μερικές παραγώγους. Αν αυτή ισχύει σε κάποιο χωρίο  $D$  και την εφοδιάσω με **οριακές συνθήκες** (τιμές της  $u(x, y)$  στο  $\partial D$  - σύνορο του  $D$ ), τότε έχω μοναδική λύση στο πρόβλημα Dirichlet:



$$(1) \forall (x, y) \in D : \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$(2) \forall (x, y) \in \partial D : u(x, y) = F(x, y)$$

**Παρ.** Ένα μεταλλικό τετράγωνο έλασμα  $D$  έχει σταθερές θερμοκρασίες στα άκρα του, όπως φαίνεται στο σχήμα.



Η θερμοκρασία του ελάσματος δίνεται από τη λύση του:

$$(1) \forall (x, y) : \begin{matrix} 0 < x < 1 \\ 0 < y < 1 \end{matrix} : u_{xx} + u_{yy} = 0$$

$$u(x, 0) = 0$$

$$(2) \forall (x, y) : u(x, 1) = 0$$

$$u(0, y) = 0$$


$$u(1, y) = 100$$

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με (1) μιγαδικές συναρτήσεις, (2) λογισμό II;

Τι ασκήσεις μπαίνουν στις εξετάσεις;

Τι σημαίνει η εξ. Laplace;

### Διακριτοποίηση εξίσωσης Laplace



$$\forall (x, y) \in D : u_{xx} + u_{yy} = 0$$

$$\forall (x, y) \in \partial D : u(x, y) = \underbrace{F(x, y)}_{\text{δεδομένη συνάρτηση}}$$

$$u_x(m\delta, n\delta) \simeq \frac{u((m+1)\delta, n\delta) - u(m\delta, n\delta)}{\delta}$$

$$u_x((m-1)\delta, n\delta) \simeq \frac{u(m\delta, n\delta) - u((m-1)\delta, n\delta)}{\delta}$$

$$u_{xx}(m\delta, n\delta) \simeq \frac{u_x(m\delta, n\delta) - u_x((m-1)\delta, n\delta)}{\delta}$$

$$u_{xx} \simeq \frac{u((m+1)\delta, n\delta) - 2u(m\delta, n\delta) - u((m-1)\delta, n\delta)}{\delta^2}$$


$$u_{yy} \simeq \frac{u(m\delta, (n+1)\delta) - 2u(m\delta, n\delta) - u(m\delta, (n-1)\delta)}{\delta^2}$$

$$0 = u_{xx} + u_{yy} = \frac{-4u(m\delta, n\delta) + u((m+1)\delta, n\delta) + u(m\delta, (n+1)\delta) + u((m-1)\delta, n\delta) + u(m\delta, (n-1)\delta)}{\delta^2}$$

$$\Rightarrow u(m\delta, n\delta) = \frac{u((m+1)\delta, n\delta) + u((m-1)\delta, n\delta) + u(m\delta, (n+1)\delta) + u(m\delta, (n-1)\delta)}{4}$$

Παρατηρούμε δηλαδή ότι η εξίσωση Laplace δηλώνει ότι η τιμή σε κάθε σημείο είναι ο μέσος όρος της τιμής των 4 γειτονικών σημείων.


**Παρ.** Στο προηγούμενο πρόβλημα:




$$u(1/2, 1/2) = \frac{1}{4} (u(1/2, 0) + u(1/2, 1) + u(0, 1/2) + u(1, 1/2))$$

$$\Rightarrow u(1/2, 1/2) = \frac{1}{4} (0 + 0 + 0 + 100)$$

$$= 25$$



Τότε θα μπορούσαμε να βρούμε τη λύση λύνοντας ένα σύστημα 9x9, ή με υπολογιστική προσέγγιση.



$$\forall (x, y) \in D : u_{xx} + u_{yy} = 0$$

$$\forall (x, y) \in \partial D : u(x, y) = \underbrace{F(x, y)}_{\text{δεδομένη συνάρτηση}}$$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial D} \operatorname{Re} \left( \frac{u(x, y) + iv(x, y)}{x - x_0 + i(y - y_0)} d(x + iy) \right)$$

$$v(x_0, y_0) = \dots$$

Από θεώρημα του Gauss/Μέσης Τιμής:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta$$

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta$$

$$v(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta,$$

δηλαδή σε κάθε σημείο η τιμή είναι ο μέσος όρος των γειτόνων.

Αυτά που μπαίνουν στις εξετάσεις είναι: Να βρεθεί η συζυγής αρμονική, και να λυθεί η εξίσωση Laplace, κάτι που θα μάθουμε τις επόμενες Παρασκευές.


## 8.2 Αρμονικές στην εξίσωση Laplace

**Παρ.** Δίνεται το χωρίο  $D = \{z : a < \operatorname{Re}(z) < b\}$

$$\forall (x, y) \in D : u_{xx} + u_{yy} = 0$$

$$\text{Να βρεθεί } u(x, y) \text{ τ.ώ } \begin{array}{l} \forall y : u(a, y) = u_1 \\ \forall y : u(b, y) = u_2 \end{array}$$

**Λύση**




Λόγω συμμετρίας υποθέτω ότι  $u(x, y) = u(x)$  οπότε  $0 = u_{xx} + u_{yy} = u_{xx} \Rightarrow u_x = k \Rightarrow u = kx + \lambda$

Χρησιμοποιώντας τις οριακές συνθήκες:

$$\left. \begin{array}{l} u_1 = u(a) = ka + \lambda \\ u_2 = u(b) = kb + \lambda \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{u(x, y) = \frac{u_1 - u_2}{a - b}x + \frac{u_1 b - u_2 a}{a - b}}$$

$$\begin{aligned}
u &= kx + \lambda \\
v &= 0 \\
u_y = -v_x &\Rightarrow 0 = -v_x \Rightarrow v = c(y) \\
\Rightarrow v_y = \frac{dc}{dy} = u_x = k &\Rightarrow v(y) = ky + c' \\
\Rightarrow f(x, y) = u + iv = kx + \lambda + i(ky + c') \\
\Rightarrow f(z) = kz + c''
\end{aligned}$$

Παρ.



$$\begin{aligned}
\hat{u}(\rho, \theta) &= u(\theta) \\
D &= \{(\rho, \theta) : \theta_1 < \theta < \theta_2\} \\
D &= \{z : \theta_1 < \text{Arg}(z) < \theta_2\} \\
u(z) &= u_1 \text{ όταν } \text{Arg}(z) = \theta_1 \\
u(z) &= u_2 \text{ όταν } \text{Arg}(z) = \theta_2
\end{aligned}$$

Παρατηρώ ότι  $\text{Arg}(z) = \text{Im}(\text{Log}(z))$


Άρα με  $f(z) = \text{Log}(z)$ , η  $\text{Arg}(z)$  είναι αρμονική όπως και η  $u(z) = k \cdot \text{Arg}(z) + \lambda$ , ισοδύναμα

$$u(x, y) = k \cdot \arctan(y, x) + \lambda$$

Σημείωση:  $\arctan(y, x) = \text{Arg}(x + iy)$

$$u(x, y) = \frac{u_1 - u_2}{\theta_1 - \theta_2} \arctan(y, x) + \lambda$$

Παρ.



$$u(x, y) = g(r)$$


Παρατηρώ ότι  $f(z) = \text{Log}(z) = \underbrace{\ln r}_{\text{αναλυτική}} + i \underbrace{\text{Arg}(z)}_{\text{αρμονική}}$

Άρα υποθέτω λύση της μορφής:

$$u(x, y) = k \ln r + \lambda \Rightarrow \dots$$

$$u(x, y) = \frac{u_1 - u_2}{R_1 - R_2} \ln(r) + c$$

**Παρ.**




$$u(x, y) = \frac{u_2 - u_1}{\theta_2 - \theta_1} \arctan(y, x) + u_1 = \boxed{\frac{1}{\pi} \arctan(y, x) = u(x, y)}$$


$$x < 0 : u(x, 0) = \frac{1}{\pi} \arctan(0, x) = \frac{\pi}{\pi} = 1$$

$$x > 0 : u(x, 0) = \frac{1}{\pi} \arctan(0, x) = \frac{0}{\pi} = 0$$

**Παρ.**



$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \arctan(y, x - x_0)$$




$$u(x, 0) = \begin{cases} u_0 & x < x_1 \\ u_1 & x_1 < x < x_2 \\ u_2 & x_2 < x < x_3 \\ \vdots & \vdots \\ u_n & x_N < x \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 u(x, y) &= \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^N (u_n - u_{n-1}) \arctan(y, x_n - x) + u_0 \\
 &= \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{N-1} (u_{n-1} - u_n) \arctan(y, x - x_n) + u_{N-1}
 \end{aligned}$$

### 8.3 Επίλυση προβλήματος Dirichlet σε άλλα χωρία

$$w = \frac{az + b}{cz + d} = f(z)$$

Μετασχηματισμός Möbius



Απεικονίζει (κύκλους και ευθείες) σε (κύκλους και ευθείες)

**Παρ.** Ο Μ/Σ  $\left(\frac{i-z}{i+z}\right)$  απεικονίζει την ευθεία  $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$  στον κύκλο  $\{(u, v) : u^2 + v^2 = 1\}$

**διότι**  $w = \frac{i-x}{i+x} \implies |w| = \frac{|i-x|}{|i+x|} = 1$

Επίσης απεικονίζει το άνω ημιεπίπεδο  $\{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y > 0\}$  στον δίσκο  $\{(u, v) : u^2 + v^2 < 1\}$

**διότι**  $|w|^2 = \left| \frac{i - (x + iy)}{i + (x + iy)} \right|^2 = \left| \frac{-x + i(-y + 1)}{x + i(y + 1)} \right|^2 = \frac{A}{B}$


$$A = |-x + i(-y + 1)|^2 = x^2 + (1 - y)^2$$

$$B = |x + i(y + 1)|^2 = x^2 + (1 + y)^2$$

Βλέπω ότι  $(1 - y)^2 < (1 + y)^2 \quad \forall y < 0$  διότι  $\forall y > 0 : A < B$

Τι σχέση έχουν αυτά με τις αρμονικές συναρτήσεις και με το πρόβλημα Dirichlet; Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λύση του προβλήματος σε χωρία πέρα του άνω ημιεπίπεδου.

**Παρ.** Να λυθεί αυτό:



$$\Phi(x, y) = \begin{cases} 1 : & 0 < \theta = \arctan(y, x) < \pi \\ 0 : & \pi < \theta = \arctan(y, x) < 2\pi \end{cases}$$

Θα χρησιμοποιήσουμε τον παραπάνω μετασχηματισμό Möbius για να μετατρέψουμε το πρόβλημα του κυκλικού δίσκου σε πρόβλημα ημιεπιπέδου. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τις οριακές συνθήκες του ημιεπιπέδου, χρησιμοποιώντας τις οριακές συνθήκες του Laplace:

$$\begin{aligned}
 1 &= \frac{i-w}{i+w} \Rightarrow i+w = i-w \Rightarrow w = -w \Rightarrow w = 0 \\
 -1 &= \frac{i-w}{i+w} \Rightarrow -i-w = i-w \Rightarrow w = \infty \\
 i &= \frac{i-w}{i+w} \Rightarrow iw-1 = i-w \Rightarrow w = 1 \\
 -i &= \frac{i-w}{i+w} \Rightarrow \dots \Rightarrow w = -1
 \end{aligned}$$

Στο επίπεδο  $uw$  το πρόβλημα  $\nabla^2 \Psi = 0$  στο  $\{(u, v) : v > 0\}$ ,  $\begin{cases} 1 & \forall(u, 0) : u > 0 \\ 0 & \forall(u, 0) : u < 0 \end{cases}$


$$\Psi = 1 - \frac{1}{\pi} \arctan(v, u)$$

οπότε  $\Phi(x, y) = 1 - \frac{1}{\pi} \arctan(v(x, y), u(x, y))$


$$\begin{aligned}
 x + iy &= \frac{i - (u + iv)}{i + (u + iv)} = \frac{\dots + i \dots}{\dots + i \dots} \Rightarrow \dots \\
 \dots &\Rightarrow u = \frac{2y}{(1+x)^2 + y^2}, \quad v = \frac{1 - (x^2 + y^2)}{(1+x)^2 + y^2}
 \end{aligned}$$

οπότε τελικά:

$$\Phi(x, y) = 1 - \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{1 - (x^2 + y^2)}{(1+x)^2 + y^2}, \frac{2y}{(1+x)^2 + y^2}\right)$$



Παρ.



$$w = f(z) = \sin(\pi z)$$

$$z = g(w) = \frac{1}{\pi} \arcsin(w)$$

Υπενθυμίζουμε ότι

$$w = \sin(\phi) = \sin(a + ib) =$$

$$= \sin(a) \cos(ib) + \sin(ib) \cos(a)$$


$$= \sin a \cosh b + i \sinh b \cos a$$

$$w = \sin(\pi z) = \sin(\pi x) \cosh(\pi y) + i \sinh(\pi y) \cos(\pi x)$$

Και η λύση προκύπτει:

$$\Psi = \frac{5}{\pi} \arctan(v, u + 1) - \frac{10}{\pi} \arctan(v, u - 1) + 10$$

$$\Phi = -\frac{5}{\pi} \arctan(\sinh(\pi y) \cos(\pi x), \sin(\pi x) \cosh(\pi y) + 1) - \frac{10}{\pi} \arctan(\sinh(\pi y) \cos(\pi x), \sin(\pi x) \cosh(\pi y) - 1) + 10$$





## 8.4 Τύποι του Poisson

Εκτός ύλης

Εκτός ύλης


### 8.4.1 Τύπος του Poisson για ημιεπίπεδο

Αν η  $f(z)$  φραγμένη και τμηματικά συνεχής και αρμονική στο άνω ημιεπίπεδο  $\forall z_0$ :

$$f(z_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y_0 f(x)}{(x-x_0)^2 + y_0^2} dx$$

και αν  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ :

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y_0 u(x, 0)}{(x-x_0)^2 + y_0^2} dx \quad \left| \quad v(x_0, y_0) = \dots \right.$$



**Απόδ.** Έστω  $z_0 \in \tilde{D}$ ,  $\bar{z}_0 \notin \tilde{D}$ .

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz \\ 0 &= \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{f(z)}{z-\bar{z}_0} dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi} \oint_C \left( \frac{1}{z-z_0} - \frac{1}{z-\bar{z}_0} \right) f(z) dz \\ &= \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{z_0 - \bar{z}_0}{(z-z_0)(z-\bar{z}_0)} f(z) dz \\ &= \frac{1}{\pi} \oint_C \frac{y_0 f(z)}{z^2 + |z_0|^2 - 2x_0 z} dz \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{[-R, R]} \frac{y_0 f(x)}{x^2 + x_0^2 + y_0^2 - 2x_0 x} dx + \frac{1}{\pi} \int_{\Gamma} \frac{y_0 f(z)}{z^2 + |z_0|^2 + 2x_0 z} dz \\ \Rightarrow f(z_0) &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{y_0 f(x)}{(x-x_0)^2 + y_0^2} dx + \underbrace{\frac{1}{\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} \frac{y_0 f(z)}{z^2 + |z_0|^2 + 2x_0 z} dz}_{=0 \text{ (λήμμα Jordan)}} \end{aligned}$$


**Παρ.** Να λυθεί το πρόβλημα

$$\begin{aligned}
u(x_0, y_0) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y_0 u(x, 0)}{(x - x_0)^2 + y_0^2} dx \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{y_0 \cdot 1}{(x - x_0^2) + y_0^2} dx \\
&= \frac{1}{\pi} \arctan(y_0, x_0 - 1) - \frac{1}{\pi} \arctan(y_0, x_0 + 1)
\end{aligned}$$

### 8.4.2 Τύπος του Poisson για δίσκο

Αν η  $f(z)$  φραγμένη, τμηματικά συνεχής και αρμονική στον δίσκο  $D_R(0)$ , τότε:

$$\begin{aligned}
f(z_0) &= \int_0^{2\pi} \frac{(R^2 - r^2) f(Re^{i\phi})}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \phi) + r^2} d\phi \\
u(r, \theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R^2 - r^2) u(r, \phi)}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\theta - \pi)} d\phi
\end{aligned}$$



**Απόδ.**

$$\zeta = Re^{i\phi}$$

$$Z = \frac{\zeta \bar{\zeta}}{\bar{\zeta}} \quad |Z| = \left| \frac{\zeta \bar{\zeta}}{\bar{\zeta}} \right| = \frac{|\zeta|^2}{|z|} = \frac{R^2}{|z|} > R, \quad \text{άρα όταν } z \in D_0(R), \text{ τότε } z \notin D_0(R)$$

$$\begin{aligned}
f(z) &= \frac{1}{2\pi} \oint \frac{\zeta f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta \\
0 &= \frac{1}{2\pi} \oint \frac{f(\zeta)}{\zeta - Z} \zeta d\phi
\end{aligned}$$

$$\frac{\zeta}{\zeta - Z} = \frac{\zeta}{\zeta - \frac{\zeta \bar{\zeta}}{\bar{\zeta}}} = \frac{z \bar{z}}{\zeta \bar{z} - \zeta \bar{\zeta}} = \frac{\bar{z}}{\bar{z} - \bar{\zeta}}$$

$$\zeta = Re^{i\phi}$$

$$\frac{d\zeta}{d\phi} = Rie^{i\phi} = \zeta i$$

$$d\zeta = i\zeta d\phi$$

$$\frac{\zeta}{\zeta - z} + \frac{\bar{z}}{\bar{\zeta} - \bar{z}} = \frac{\zeta(\bar{\zeta}) + \bar{\zeta}(\zeta - z)}{|\zeta - z|^2} = \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(z) &= \frac{1}{2\pi} \oint \left( \frac{\zeta}{\zeta-z} - \frac{\zeta}{\zeta-\bar{z}} \right) f(\zeta) d\zeta \\ \Rightarrow f(z) &= \frac{1}{2\pi} \oint_C \left( \frac{\zeta}{\zeta-z} - \frac{\bar{z}}{\bar{z}-\bar{\zeta}} \right) \\ \Rightarrow f(z) &= \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{(R^2 - r^2) f(Re^{i\phi})}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\theta - \phi)} \end{aligned}$$

**Παρ.** Να λυθεί το πρόβλημα: (???)

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(1-r^2) 100}{1^2 + r^2 - 2r \cos(\theta - \phi)} d\phi \\ u(r, \theta) &= \frac{2 \cdot 50}{\pi} \arctan(r^2 - 1, 2r \sin \theta) \end{aligned}$$

$$\frac{\zeta}{\zeta-z} + \frac{\bar{z}}{\bar{\zeta}-\bar{z}} = \frac{|\zeta|^2 - |z|^2}{|\zeta-z|^2}$$

$$\frac{\zeta+z}{\zeta-z} = \frac{\zeta+z}{\zeta-z} \cdot \frac{\bar{\zeta}-\bar{z}}{\bar{\zeta}-\bar{z}} = \frac{\zeta\bar{\zeta} - z\bar{z} + i \cdot (\dots)}{|\zeta-z|^2}$$

$$\operatorname{Re} \left( \frac{\zeta+z}{\zeta-z} \right) = \frac{\zeta}{\zeta-z} + \frac{\bar{z}}{\bar{\zeta}-\bar{z}}$$

$$\frac{\zeta+z}{\zeta-z} = \frac{1 + \frac{z}{\zeta}}{1 - \frac{z}{\zeta}} = \left( 1 + \frac{z}{\zeta} \right) \left( 1 + \frac{z}{\zeta} + \left( \frac{z}{\zeta} \right)^2 + \dots \right) = \operatorname{Re} \left( 1 + 2 \frac{z}{\zeta} + 2 \left( \frac{z}{\zeta} \right)^2 + 2 \left( \frac{z}{\zeta} \right)^3 \right)$$

$$z = re^{i\theta}, \quad \zeta = Re^{i\phi}$$

$$\frac{z}{\zeta} = \frac{r}{R} e^{i(\theta-\phi)}$$

$$\left( \frac{z}{\zeta} \right)^2 = \frac{r^2}{R^2} e^{i2(\theta-\phi)}$$

$$\operatorname{Re} \left( \frac{z}{\zeta} \right)^n = \operatorname{Re} \left( \frac{r^n}{R^n} e^{in(\theta-\phi)} \right) = \frac{r^n}{R^n} \cos(n(\theta-\phi))$$

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= \frac{1}{2\pi} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{r}{R} \right)^n \cos n(\theta-\phi) \right) u(R, \phi) d\phi = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{r}{R} \right)^n \int_0^{2\pi} (\cos n\theta \cos n\phi + \sin n\theta \sin n\phi) u \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{r}{R} \right)^n \left[ \cos n\theta \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(R, \phi) \cos n\phi d\phi + \sin n\theta \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(R, \phi) \sin n\phi d\phi \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{r}{R} \right)^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) = u(r, \theta) \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(R, \phi) \cos n\phi d\phi, \quad b_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(R, \phi) \sin n\phi d\phi$$

### 8.4.3 Επίλυση της $\nabla^2 u$ με χωρισμό μεταβλητών σε πολικές συντεταγμένες

$$u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0$$

Υποθέτω ότι η λύση είναι της μορφής  $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ , οπότε:

$$\begin{aligned}
 R_{rr}\Theta + \frac{1}{r}R_r\Theta + \frac{1}{r^2}R\Theta_{\theta\theta} &= 0 \\
 \frac{r^2}{\Theta}r^2R_{rr} + rR_r + R\frac{\Theta_{\theta\theta}}{\Theta} &= 0 \\
 \frac{1}{\Theta}r^2R_{rr} + \frac{rR_r}{R} + \frac{\Theta_{\theta\theta}}{\Theta} &= 0 \\
 \frac{1}{\Theta}r^2R_{rr} + \frac{rR_r}{R} &= -\frac{\Theta_{\theta\theta}}{\Theta} \\
 \Rightarrow r^2R_{rr} + rR_r - k^2R &= 0 \\
 \Theta_{\theta\theta} + k^2\Theta &= 0
 \end{aligned}$$

Λύσεις:  $\Theta(\theta) = A_k \cos k\theta + B_k \sin k\theta$

Για να έχει περίοδο  $2\pi$ , πρέπει  $k \in \mathbb{N}$ .

Τελικά όλες οι  $\Theta_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta$  είναι λύσεις της εξίσωσης και αντίστοιχα λύσεις  $R_n(r)$ .

Οπότε έχω λύσεις  $u_n(r, \theta) = R_n(r)\Theta_n(\theta)$  και επίσης η  $u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} R_n(r)\Theta_n(\theta)$   
Δηλ.

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} R_n(r) (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta)$$